

# SGLT2 억제제 신규 처방 주의사항

SGLT2 Inhibitor — 포시가 (Forxiga · Dapagliflozin) · 자디앙 (Jardiance · Empagliflozin) · 슈글렛 (Suglat · Ipragliflozin) · 인보카나 (Invokana · Canagliflozin). 혈당과 함께 심부전·신장도 보호하는 약물이지만 안전 복용을 위해 아래 사항을 꼭 확인해 주세요.



## 한눈에 보는 안전 복용 수칙 (Key Safety Numbers)

|                                                          |                                                           |                                                                                   |                                                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p>매일 수분 섭취</p> <p><b>1.5~2</b></p> <p>L / 일 (탈수 예방)</p> | <p>수술·시술 전 중단</p> <p><b>3</b></p> <p>일 전 (SSTOP rule)</p> | <p>신기능 사용 가능</p> <p><b>eGFR ≥ 30</b></p> <p>mL/min · 포시가 25까지 시작 (KDIGO 2024)</p> | <p>생식기 진균 감염 위험</p> <p><b>3~5</b></p> <p>배 ↑ (위생 관리 필수)</p> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

## SGLT2 억제제는 어떻게 작용하나요? (Mechanism)

|                                                                                          |                                                                                                               |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>신장에서 당 배출</p> <p>SGLT2 단백질을 차단해 <b>혈당을 소변으로 직접 배출</b> (하루 50~80g · 200~320 kcal).</p> | <p>혈당·체중·혈압 동시 ↓</p> <p>HbA1c <b>0.5~1.0% ↓</b> · 체중 <b>2~3kg ↓</b> · 수축기혈압 <b>3~5 mmHg ↓</b>. 저혈당 위험 낮음.</p> | <p>심부전·신장 보호</p> <p>당뇨 없어도 <b>심부전 입원 ↓ 30%</b> · 신장기능 악화 ↓ 40%. 심혈관·신장 동반 환자 우선 권고.</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

## 복용 중 일상 수칙 (Do & Don't)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>권장 행동 · DO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>매일 물 1.5~2L — 탈수·저혈압 예방의 핵심</li> <li>회음부 청결 유지 — 배뇨 후 마른 수건, 통기성 속옷</li> <li>정해진 시간에 매일 1회 복용 — 식사와 무관, 아침 권장</li> <li>인슐린·메트포민은 그대로 유지 — 임의로 함께 줄이지 않기</li> <li>정기 혈액검사 (3~6개월) — 신기능·전해질·HbA1c 확인</li> <li>약 이름·용량을 가족·다른 의료진과 공유 — 응급 시 즉시 안내</li> </ol> | <p>피해야 할 행동 · DON'T</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>임의로 중단·증량 금지 — 'Sick Day Rules' 해당 시만 예외</li> <li>극단적 저탄수화물·키토 다이어트 금지 — 정상혈당 케톤산증 위험 ↑</li> <li>장시간 금식·과음 금지 — 케톤 생성 자극, 탈수 가중</li> <li>더운 날·운동 후 수분 부족 방치 금지 — 어지럼증·실신 위험</li> <li>회음부 통증·홍반·가려움 무시 금지 — 즉시 진료 필요</li> <li>자가 판단으로 이뇨제·NSAIDs 추가 복용 금지 — 신기능 악화 위험</li> </ol> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 즉시 약 중단 + 응급실 방문이 필요한 경우 (Red Flags)

|                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>SICK DAY RULES · 일시 중단 후 의료진 연락</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>발열·구토·설사로 식사 못 할 때 — 즉시 중단, 회복 후 재개</li> <li>수술·전신마취·수면내시경 3일 전 — SSTOP 룰, 시술 후 재개</li> <li>24시간 이상 단식·급성 입원 시 — 입원 의료진에 복용 알림</li> </ol> | <p>즉시 119 또는 응급실 (CALL 119 / ER)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>정상혈당 케톤산증 — 오심·구토·복통·과호흡·과일향 입냄새 (혈당 정상이어도!)</li> <li>푸르니에 괴저 — 회음부·생식기 심한 통증·붓기·홍반 + 발열 (생명 응급)</li> <li>심한 탈수·기립성 저혈압 — 실신·8시간 이상 소변 거의 없음</li> </ol> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

