

위축성위염 · 장상피화생, 의미와 관리 한눈에

위 점막의 변화가 무엇이고, 위암 위험과 추적 관찰을 어떻게 설계해야 하는지 알아봅니다

먼저 결론 — 위축성위염·장상피화생, 세 가지만

흔한 변화이고, 관리하면 위암을 일찍 찾거나 늦출 수 있습니다



1

나이 들수록 흔합니다

나이가 들수록 흔해져, 50대 이후 위내시경에서
자주 발견되는 변화입니다.

혼자만의 일이 아닙니다



2

모두 위암이 되지는 않습니다

위암으로 가는 길목의 변화이지만, 대부분은
위암으로 진행하지 않습니다.

겉내기보다 관리하기



3

제균 · 생활 · 정기 내시경

헬리코박터균이 있으면 없애고, 금연·싱겁게
먹기, 정해진 간격의 내시경이 핵심입니다.

내시경 날짜 지키기

Tip · 진단받았다는 것은 '조심해서 지켜볼 위'라는 뜻이지 위암이라는 뜻이 아닙니다.

근거 · 대한소화기내시경학회 2020 위암 검진 지침

위 점막이 얇아지고, 다른 세포로 바뀝니다

오래된 염증으로 생기는 느린 변화입니다

위축성위염

위액을 만드는 샘이 줄어 위 점막이 **얇아진** 상태입니다.

장상피화생

위 점막 세포가 **장 세포**처럼 바뀐 상태로, 위축보다 한 걸음 더 나아간 변화입니다.

위암 위험

정상 위보다 위암 위험이 **3~5배** 높고, 한 번 생긴 변화는 약으로 되돌리기 어렵습니다.




그림 · 왼쪽 정상 점막에서 오른쪽으로 갈수록 점막이 얇아지고 모양이 바뀝니다(설명용 그림).

근거 · 대한소화기내시경학회 2020 위암 검진 지침

정상 위에서 위암까지 — 천천히 한 단계씩

대부분은 중간 단계에서 멈춥니다 — 위암까지 가는 분은 일부입니다

1

정상 위

위액·점액이 제대로 나옵니다.

건강한 점막

2

만성 위염

헬리코박터균 등으로 염증이 오래 이어집니다.

제균이 중요

3

위축성위염

위액 샘이 줄어 점막이 얇아집니다.

정기 내시경

4

장상피화생

점막 세포가 장 세포처럼 바뀝니다.

더 자주 내시경

5

일부에서 위암

세포 이상(이형성)을 거쳐 생깁니다.

일찍 찾으면 내시경 치료

Tip · 헬리코박터균·50대 이상·흡연·짠 음식·가족력이 겹칠수록 진행 위험이 쌓입니다.

근거 · Correa 1992 · 대한소화기내시경학회 2020

내시경 결과지의 'C-1 ~ O-3' 읽는 법

위축이 위의 아래쪽에만 있는지, 위 몸통까지 넓게 퍼졌는지를 적은 표시입니다

결과지 표시	위축이 있는 곳	의미
C-1 · C-2 · C-3 (좁은 위축)	위의 아래쪽(출구 쪽)에 머물립니다. 숫자가 클수록 조금 더 위로 올라온 것입니다.	비교적 가벼운 단계 — 정기 내시경으로 지켜봅니다.
O-1 · O-2 · O-3 (넓은 위축)	위의 몸통까지 퍼졌습니다. O-3은 위 전체에 가깝게 넓습니다.	위암 위험이 더 높아 내시경 간격을 짧게 잡습니다.

Tip · 결과지에 표시가 없으면 진료 때 '위축이 좁은지 넓은지' 여쭙 보세요.

근거 · Kimura·Takemoto 1969 내시경 위축 분류

진행을 빠르게 하는 것들

바꿀 수 있는 요인을 찾아 줄이는 것이 관리의 핵심입니다



그림 · 여러 요인이 겹칠수록 위 점막 변화가 빨라집니다(설명용 그림).

헬리코박터균

가장 큰 원인입니다. 오래 감염되면 위암 위험이 약 **6배**입니다.

담배 · 짠 음식

담배와 젓갈·장아찌 같은 짠 음식이 위 점막을 자극합니다.

나이 · 가족력

50대 이후 흔해지고, 부모·형제가 위암이면 위험이 **2~3배**입니다.

자가면역 위염

면역이 위를 공격하는 경우로, 비타민 B12 부족·빈혈(악성빈혈)이 올 수 있습니다.

근거 · 대한소화기내시경학회 2020 · IARC 1군 발암 평가

헬리코박터균 제균을 권하는 경우

위축성위염·장상피화생은 제균을 권하는 경우에 들어갑니다

위축성위염 · 장상피화생

제균하면 변화가 진행되는 속도를 늦추고 위암 위험을 줄입니다. **이 자료를 보시는 분**에 해당합니다.

위암 가족력(부모·형제·자녀)

균이 있으면 제균해 위암 위험을 의미 있게 낮춥니다.

위·십이지장 궤양

제균하면 궤양 재발이 약 80%에서 5% 미만으로 크게 줄어듭니다.

조기 위암을 내시경으로 떼 뒤

남은 위에서 새 위암이 생길 위험이 약 절반으로 줄어듭니다.

Tip · 제균 치료 뒤에는 균이 없어졌는지 꼭 다시 확인합니다.

근거 · 대한상부위장관·헬리코박터학회 진료 지침

나에게 맞는 내시경 간격

위축의 범위·장상피화생·가족력에 따라 담당 의사가 정합니다

이런 경우	내시경 간격
처음 진단받을 때	위축 범위를 보고, 헬리코박터균 검사와 조직검사를 함께 합니다.
좁은 위축성위염	보통 2년마다 — 국가 위암검진 간격보다 길게 두지 않습니다.
넓은 위축·장상피화생이 넓은 · 위암 가족력	1~2년마다 로 간격을 좁힙니다.
심한 세포 이상(고도 이형성)· 조기 위암이 의심되면	바로 내시경 절제 등 치료를 상의합니다.

그림 · 정해진 간격으로 내시경을 이어 가며 변화를 비교합니다(설명용 그림).



근거 · 대한소화기내시경학회 위암 검진 지침

진행을 늦추는 생활 관리

되돌리는 음식은 없지만, 진행 속도와 위암 위험은 줄일 수 있습니다

이렇게 하세요

매일의 습관이 위 점막을 지킵니다.

- 신선한 채소·과일을 끼니마다 충분히
- 싱겁게 — 국물·찌개는 절반만
- 담배는 끊기
- 규칙적인 운동과 알맞은 체중

VS

이것은 피하세요

위 점막을 자주 자극하는 것들입니다.

- 젓갈·장아찌 같은 짠 발효식품 자주 먹기
- 훈제·탄 음식·햄·소시지 자주 먹기
- 잦은 폭음
- 증상이 없다고 내시경 미루기

Tip · 처방 없이 위염약을 오래 스스로 드시는 것은 피하고, 필요하면 진료에서 상의하세요.

근거 · 대한소화기내시경학회 생활 관리 권고 · WCRF

이런 증상이 새로 생기면 바로 오세요

정해진 내시경 날짜를 기다리지 않아도 됩니다



1

모르게 빠지는 체중

식사량은 그대로인데 몸무게가 줄어듭니다.

바로 진료



2

검은 변

짜장처럼 검은 변은 위에서 피가 나고 있다는 신호일 수 있습니다.

바로 진료



3

삼키기 어려움

음식이 목이나 가슴에 걸리는 느낌이 계속됩니다.

바로 진료

Tip · 이런 증상이 없더라도 정해진 간격의 내시경은 꼭 받으세요.


근거 · 대한소화기내시경학회 위암 검진 지침

오늘 기억할 여섯 가지

제균 · 생활 관리 · 정기 내시경 — 함께 지켜 가겠습니다

- 01 위축성위염·장상피화생은 위암의 **길목**이지만 대부분 위암이 되지 않습니다
- 02 헬리코박터균 검사를 받고, 있으면 **제균**합니다
- 03 금연 · 싱겁게 · 채소와 과일을 충분히
- 04 좁은 위축은 **보통 2년**, 넓은 위축·장상피화생은 **1~2년**마다 내시경
- 05 증상이 없어도 내시경 날짜를 미루지 않습니다
- 06 체중 감소·검은 변·삼킴 곤란은 **바로** 진료

Tip · 지난 내시경 결과지를 가져오시면 간격을 정확히 정할 수 있습니다.



근거 · 대한소화기내시경학회 2020 · 헬리코박터학회 지침

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

위축성위염·장상피화생을 진단받은 분을 위한 설명자료입니다. 내시경 간격과 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한소화기내시경학회 2020 위암 검진 지침 · Correa 1992 · Kimura-Takemoto 1969 · 대한상부위장관·헬리코박터학회 지침 · IARC · WCRF



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요