

아이가 자꾸 배가 아파요 검사는 정상인데, 왜 그럴까요?

소아 기능성 복통·과민성 장 증후군 — 약 없이 식사와 생활습관으로 편안해지는 근거 기반 관리

대부분은 위험한 병이 아닙니다

검사에서 이상이 없는 반복성 복통은 대개 '기능성'이며, 시간과 좋은 생활습관으로 대다수가 좋아집니다

90% 이상

반복성 복통으로 병원을 찾은 아이 **10명 중 9명 이상**은
검사에서 위험한(기질적) 원인이 없는 '기능성'입니다.

대부분 식사·생활 관리로 좋아집니다

👉 장이 망가진 것이 아닙니다

혈액검사·내시경에서 이상이 보이지 않지만 복통이 반복되는 흔한 상태입니다. 뇌와 장을 잇는 신경망(뇌-장 축)이 **예민해진** 것입니다.

😊 나쁜 병으로 번지지 않습니다

기능성 복통과 과민성 장 증후군은 암이나 염증성 장 질환으로 **진행하지 않습니다**.

🧠 그래도 잘 이해해야 합니다

통증이 반복되면 아이의 불안·수면·학교생활이 힘들 수 있어, 이해하고 관리하는 것이 중요합니다.

Tip · 아이 앞에서는 걱정보다 “괜찮아질 거야”라는 말이 먼저입니다.

근거 · Rome IV 2016

기능성 복통과 과민성 장 — 뇌-장 축의 문제입니다

검사에 나오지 않을 뿐, 아이가 느끼는 통증은 진짜입니다

장이 예민해진 상태

장의 신경이 예민해지면 정상적인 장 운동이나 가스도 뇌에서 **심한 통증**으로 느껴집니다. 이것을 '내장 과민성'이라고 합니다.

궤병도, 부모 잘못도 아닙니다

예민한 성격이나 궤병 때문이 아니라 의학적으로 확인된 뇌-장 신경의 반응 변화입니다.

통증을 키우는 '방아쇠'

스트레스·긴장·불규칙한 생활·수면 부족, 특정 음식이 통증을 더 자주, 더 세게 만듭니다. 그래서 식사·생활을 다듬어 과민 반응을 가라앉히는 접근이 효과적입니다.




그림 · 뇌와 장은 신경으로 이어져 있어, 예민해진 신호가 통증으로 크게 느껴집니다(설명용 그림).

근거 · Rome IV 2016

반복되는 복통이 아이에게 남기는 것들

통증 그 자체보다, 아이의 일상과 마음에 미치는 영향이 더 클 수 있습니다



불안

“또 아프면 어쩌지” 걱정하며 아플 만한 상황을 피합니다. 불안은 다시 통증을 키웁니다.



우울감

하고 싶은 활동을 못 해 위축되고 기분이 가라앉습니다. 통증과 기분은 서로 영향을 줍니다.



학교 결석

결석·조퇴가 잦아지면 학습과 친구 관계에 영향을 주고, 결석 자체가 불안을 키웁니다.



삶의 질 저하

놀이·식사·여행처럼 또래가 누리는 일상 활동이 줄어듭니다.



수면 문제

잠들기 어렵거나 자다 깨면 피로가 쌓이고, 피로는 통증에 더 민감하게 만듭니다.



가족의 걱정

부모의 불안과 잦은 병원 방문·반복 검사가 아이에게도 전해져 온 가족이 지칩니다.

Tip · 여섯 가지는 서로 꼬리를 뭍니다 — 불안·수면·결석이 다시 통증을 키웁니다.

근거 · Rome IV 2016 · Br J Gen Pract 2026

왜 '먹는 것'과 '생활 리듬'이 중요할까요?

예민한 장은 음식·식사 시간·생활 리듬에 크게 반응합니다 — 약을 늘리기 전에 먼저 다듬을 부분

통증을 키우는 쪽

무엇을·언제·어떻게 먹는지가 통증의 **빈도와 세기**를 바꿉니다.

- 특정 음식이 장에서 가스·수분을 늘립니다
- 어떤 음식은 장을 직접 자극합니다
- 예민한 장은 이 신호를 **통증으로 크게** 느낍니다
- 오래 굶다 몰아 먹으면 더 예민하게 반응합니다

VS

가라앉히는 쪽

규칙적인 식사·충분한 수분·안정된 생활 리듬이 **과민 반응**을 달랠니다.

- 검사가 정상이면 약보다 **식사·생활 조절이 먼저**입니다
- 약물은 최소화합니다
- 부작용이 없는 안전한 첫걸음입니다
- 온 가족이 함께 실천할 수 있습니다

Tip · 순서는 안심 → 식사·생활 조절 → 필요할 때만 약입니다.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

도움이 되는 식사 습관 6가지

거창한 식이요법이 아니라, 오늘부터 집에서 바로 실천할 수 있는 기본기입니다



- 
규칙적인 식사
 아침을 거르지 않고 정해진 시간에 — 몰아 먹으면 장이 예민해집니다
- 
충분한 수분
 물을 자주 — 변이 부드러워져 변비형 복통에 특히 도움이 됩니다
- 
적절한 식이섬유
 채소·과일·통곡물을 조금씩 — 한꺼번에 늘리면 가스가 찹니다
- 
천천히·꼭꼭 씹기
 급히 먹으면 공기를 삼켜 더부룩합니다 — 식사 중 TV·휴대폰 끄기
- 
균형 잡힌 식단
 성장기라 무리한 제한은 금물 — 오래 빠기 전엔 의료진과 상의
- 
유산균·페퍼민트(선택)
 도움이 되는 아이도 있지만 개인차가 큼 — 시작 전 상의

그림 · 정해진 시간에, 물 한 잔과 함께, 화면은 끄고 천천히 먹습니다(설명용 그림).

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

배를 더 아프게 할 수 있는 음식 — 줄여 보세요

아이마다 방아쇠는 다르지만, 아래 음식들은 예민한 장을 자극하는 흔한 원인입니다

음식	왜 아플 수 있나	이렇게 바꿔 보세요
탄산음료 · 사이다	탄산 가스가 배를 부풀려 더부룩함과 통증을 부릅니다	물이나 보리차로
과일주스 · 단것	과당·소르비톨(무설탕 껌·젤리 포함)이 가스·설사를 일으킵니다	주스 대신 생과일을 적당히
카페인	콜라·초콜릿·에너지음료가 장을 자극하고 잠을 방해합니다	특히 저녁에는 피하기
기름지고 튀긴 음식	소화가 느려 식후 복통·더부룩함을 잘 일으킵니다	튀김·패스트푸드 줄이기
맵고 자극적인 음식	아이마다 다르지만 흔한 방아쇠입니다	반복되면 잠시 줄여 반응 보기
유제품 과다(해당 시)	유당불내증이면 우유·아이스크림 뒤 복통·설사가 생깁니다	의심되면 진료 때 확인

주의 · 저포드맵 같은 엄격한 제한식을 아이 스스로·오래 하면 영양과 성장에 해롭습니다. 필요하면 의료진·영양 상담과 함께 짧게.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

우리 아이만의 방아쇠 찾기 — 음식·통증 일기

2~4주만 꾸준히 적으면, 반복되는 음식·상황 패턴이 눈에 보입니다

1 무엇을 적나

먹은 음식과 시간 · 언제·얼마나 아팠는지 · 배변 상태 · 그날의 스트레스·수면을 짧게 적습니다.

2 얼마나

2~4주만 꾸준히 적으면 반복되는 음식·상황 패턴이 보입니다.

3 어떻게 쓰나

진료 때 함께 해석해, 반복되는 방아쇠 음식만 **골라서** 줄입니다. 막연한 광범위 제한이 아닙니다.



핵심 · 기록으로 확인된 방아쇠만 줄이고, 나머지는 골고루 먹여 성장에 필요한 영양을 지켜 주세요.

근거 · 관리 방법 — 음식·증상 일기 2~4주 → 방아쇠 확인 → 표적 조절

하루의 리듬이 장을 편하게 합니다

잠·활동·배변 — 식사만큼 중요한 생활 습관입니다



아침 · 충분한 잠

장 리듬이 안정됩니다

낮 · 등교 유지와 가벼운 운동

매일의 활동이 통증 예민함을 낮춥니다

밤 · 정해진 잠자리

피로는 통증을 키웁니다

Tip · 배변 습관도 리듬입니다 — 아침 식후 화장실에 여유 있게 앉기. 변비는 소아 복통의 아주 흔한 원인입니다.

근거 · 관리 방법 — 규칙적 수면·가벼운 운동·배변 습관

우리 아이에게 어떻게 적용할까요?

경고 신호(11쪽)가 없다면, 검사·약물에 앞서 식사·생활부터 단계적으로 시도합니다

1



안심과 이해

의사가 위험한 원인을 배제해 '기능성'으로 확인하고, 위험한 병이 아님을 함께 이해합니다. 통증·음식 일기로 방아쇠를 살핍니다.

위험한 병이 아님을 확인

2



식사 다듬기

규칙적인 식사·충분한 수분·적정 식이섬유를 지키고, 확인된 방아쇠 음식(탄산·단것·카페인·기름진 음식)을 줄입니다.

방아쇠 음식만 골라 줄이기

3



생활 리듬

규칙적인 수면·가벼운 운동·등교 유지와 편안한 배변 습관이 기본입니다. 통증에 온 가족이 너무 크게 반응하지 않는 것도 중요합니다.

잠·운동·등교·배변

4



안 나아지면 진료실로

몇 주 실천해도 나아지지 않거나 경고 증상이 있으면 추가 평가·약물·전문 치료로 조정합니다.

몇 주 뒤 다시 평가

안내 · 우리 아이에게 맞는 식사 조절과 생활 계획은 원내에서 함께 구체적으로 정해 드립니다.

근거 · NASPGHAN · Rome IV 2016

이런 신호가 있으면 식사 조절보다 검사가 먼저입니다

하나라도 있으면 기능성으로 단정하지 말고 반드시 추가 평가가 필요합니다



체중 감소 · 성장 지연

다이어트 없이 빠지는 체중, 키·몸무게 성장 곡선에서 벗어나는 경우는 위험한 원인을 찾는 **정밀 검사**가 필요합니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**



혈변 · 밤중 통증 · 반복 발열

대변에 피가 섞이거나, 잠을 깨우는 밤중 통증 · 밤중 설사, 반복되는 열은 기능성 복통에서는 **드문 경고 신호**입니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**



가족력 · 삼킴 곤란 · 계속되는 구토

염증성 장 질환·셀리악병 가족력, 삼키기 힘들, 반복되는 구토는 다른 병을 시사하므로 **검사를 우선**합니다.

식사 조절보다 **검사가 먼저**

Tip · 이런 신호는 기능성 복통에서는 드뭅니다. 식사·생활 관리는 위험한 원인을 배제한 뒤 시작합니다.

근거 · 소아 복통 경고 증상

오늘 꼭 기억할 7가지

소아 기능성 복통·과민성 장은 이해와 식사·생활 관리로 충분히 좋아집니다

- 01 아이 앞에서 걱정을 드러내기보다 **“괜찮아질 거야”**라고 안심시켜 주세요
- 03 **통증·음식 일기**로 스트레스·식사·수면 등 방아쇠를 함께 찾아봅니다
- 05 탄산·과한 주스나 단것·카페인·기름진 음식을 **줄여 보세요**
- 07 체중 감소·혈변·성장 지연 등 **경고 증상은 바로 진료·검사**로 확인합니다

- 02 기능성 복통·과민성 장은 **뇌-장 축의 문제** — 궤병도, 부모 잘못도 아닙니다
- 04 **규칙적인 식사·충분한 수분·등교 유지**가 회복의 기본입니다
- 06 성장기이므로 **무리한 제한식은 금물** — 음식을 오래 빼기 전 의료진과 상의하세요

안심하고, 살펴보고,
식사·생활을 단계적으로

Tip · 이 장을 사진으로 찍어 냉장고에 붙여 두세요.

근거 · Rome IV 2016 · NASPGHAN

대부분 좋아집니다 — 식사와 생활 관리로 더 편안하게

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광고바른내과

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

대부분 좋아집니다

안심과 이해에서 시작해, 아이에게 맞는 식사 조절과 생활 계획을 함께 찾아가겠습니다. 궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요.

참고한 자료

Rome IV 2016(뇌-장 상호작용 장애 분류) · NASPGHAN 소아 기능성 복통 관리 · Br J Gen Pract 2026



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요