

폐렴구균 백신, 내 몸을 지키는 똑똑한 예방

한국·미국 최신 권고(2025~2026)로 본 성인·소아 폐렴구균 백신 접종 안내

폐렴구균은 왜 위험한가요?

지역사회에서 걸리는 세균성 폐렴의 가장 흔한 원인균이고, 백신으로 예방할 수 있습니다

약 20%

고령자 사망률

나이 든 분이 감염되면 사망률이 약 20%에 이릅니다

65세+

국가 무료 접종 대상

다당백신(PPSV23) 1회를 무료로 맞습니다

19세부터

위험군은 더 일찍

만성질환·면역저하가 있으면 19~64세에도 권합니다



폐렴만 일으키지 않습니다

균이 피나 뇌척수액으로 퍼지면 수막염·패혈증 같은 **침습성 감염**이 됩니다. 65세 이상·만성질환·면역저하에서 합병증이 잦습니다.



접종으로 위험을 줄입니다

백신이 모든 폐렴을 막지는 못하지만, 접종하면 폐렴구균으로 인한 중증 감염 위험을 **크게 줄일 수 있습니다**.

Tip · 폐렴구균 백신은 독감 백신과 다른 백신입니다 — 둘 다 챙기세요.

근거 · 질병관리청 2024 · 미국감염학회·홍부학회 지역사회 폐렴 지침

세 가지 감염과 특히 위험한 분들

폐렴구균은 폐·뇌·혈액으로 들어가 심각한 합병증을 일으킬 수 있습니다

1 폐렴 가장 흔함

기침·고열·숨참·가슴 통증. 고령자는 의식 저하로만 나타나기도 합니다.

2 수막염 침습성

뇌를 싸 막의 염증. 두통·열·목 경직 — 후유증과 사망률이 높습니다.

3 패혈증 응급

균이 피를 타고 온몸으로 퍼져 혈압 저하·장기 손상으로 진행합니다.

4 65세 이상 무료 접종

면역이 자연히 떨어져 가장 취약합니다.

5 만성질환·흡연자 19~64세도

당뇨·심부전·만성 폐질환·간경변·만성 신부전·흡연.

6 면역저하·인공와우 최우선

항암·장기이식·HIV·비장 없음·면역억제제, 인공와우, 뇌척수액 누출.



그림 · 고령자, 만성질환이 있는 분, 면역이 약한 분이 폐렴구균 감염에 특히 취약합니다(설명용 그림).

Tip · 내가 위험군인지 모르겠다면 복용 중인 약 목록을 가지고 상담하세요.

근거 · 대한감염학회 2024 성인 예방접종 권고 · 질병관리청

두 종류 백신 — 단백결합백신과 다당백신

면역을 만드는 방식과 쓰는 대상이 다릅니다



그림 · 두 종류 백신이 서로 다른 방식으로 폐렴구균을 막는 모습입니다(설명용 그림).

Tip · 백신 이름의 숫자가 클수록 막는 균 종류가 많습니다.

단백결합백신(PCV) — PCV13·15·20·21

균의 껍질 성분에 단백질을 붙여 **면역 기억**을 만듭니다. 아이부터 어른까지 효과가 있고 오래갑니다. 숫자는 막는 균 종류(혈청형)의 수입니다.

다당백신(PPSV23)

23가지 균 종류를 넓게 막지만 면역 기억을 잘 만들지 못합니다. 2세 미만에는 효과가 적고, 단독으로 쓰면 추가 접종이 필요할 수 있습니다.

그래서 이렇게 씁니다

성인은 단백결합백신을 중심으로, 필요하면 다당백신을 이어서 맞습니다. 어떤 조합이 맞는지는 진료에서 정합니다.

근거 · 미국 예방접종자문위원회(ACIP) 2024 권고

국내외에서 쓰는 폐렴구균 백신

단백결합백신은 숫자가 클수록 막는 균 종류가 많습니다

백신	막는 균 종류	특징
프리베나13 (PCV13)	13가지	소아 국가예방접종에 오래 쓰인 표준 백신 — 성인에게는 PCV20으로 바뀌는 추세
박스누반스 (PCV15)	15가지	단독 또는 다당백신과 순서대로 접종 — 한국 성인 순차 접종의 첫 백신
프리베나20 (PCV20)	20가지	성인 1회 로 끝나 다당백신 추가가 필요 없음 — 한국·미국 모두 우선 권장
캠박시브 (PCV21)	21가지	성인 침습성 감염 균 종류에 맞춘 최신 백신 — 한국 2025년 8월 허가, 2026년 3월 출시
프로디악스23 (PPSV23)	23가지	성인용(2세 미만 효과 적음) — 한국 65세 이상 무료, 단독이면 추가 접종 필요할 수 있음

Tip · 어떤 백신을 맞았는지 이름을 기록해 두면 다음 접종 계획이 쉬워집니다.

근거 · 질병관리청 2024~2026 · ACIP 2025 · 식품의약품안전처 2025 PCV21 허가

한국 성인은 이렇게 맞습니다

대한감염학회 권고 — PCV20 또는 PCV21 한 번이 가장 간편합니다



01

PCV20·PCV21 1회

건강한 65세 이상, 위험군
 19~64세 모두 1회로 끝납니다.
 PCV21(캡박시브)은 2026년
 3월 국내에 나와 막는 군 종류를
 넓은 선택지입니다.

가장 간편한 선택



02

PCV15 → PPSV23

PCV15를 먼저 맞고 일반인은
 1년 뒤, 면역저하자는 8주 뒤
 PPSV23을 맞습니다.
 PCV20을 쓸 수 없을 때의
 대안입니다.

PCV20을 못 쓸 때



03

건강한 65세 이상

국가 무료 접종은
 PPSV23입니다. 더 넓게 막고
 싶으면 본인 부담으로 PCV20
 1회를 맞는 것을 권합니다.

무료 + 선택



04

19~64세 위험군

당뇨·심장·폐·간 만성질환, 흡연,
 면역저하, 인공와우 이식,
 뇌척수액 누출이 있으면 적극
 접종합니다.

나이와 관계없이

Tip · 무료 백신과 본인 부담 백신의 차이는 접종 전에 꼭 물어보세요.

근거 · 대한감염학회 2024 성인 예방접종 권고 · 질병관리청 국가예방접종

순차 접종 — PCV15 다음 PPSV23

PCV20 한 번이 어려울 때 쓰는 네 단계 일정입니다

1 PCV15 접종 1회

면역 기억을 만듭니다. 흔한 접종 반응 외에 특별한 주의는 없습니다.

2 기다리기 1년·8주

일반(65세 이상·만성질환)은 1년, 면역저하·인공와우·뇌척수액 누출은 8주.

3 PPSV23 접종 1회

막는 균 종류를 넓힙니다. 면역저하자는 5년 뒤 한 번 더 맞을 수 있습니다.

4 일정 마무리 65세 이후

19~64세에 맞은 만성질환자는 65세 이후 PPSV23 1회를 더 맞을 수 있습니다(5년 간격).



그림 · 첫 백신 뒤 간격을 두고 두 번째 백신으로 막는 범위를 넓힙니다(설명용 그림).

Tip · PCV20 한 번을 고르면 PPSV23 추가가 필요 없어 가장 간편합니다.

근거 · 대한감염학회 2024 순차 접종 권고

한국과 미국 권고 비교

미국은 2024년에 모든 사람 접종 나이를 65세에서 50세로 낮췄습니다

한국 — 대한감염학회·질병관리청

모든 성인 접종 나이 **65세 이상**

- 우선 권장 백신: PCV20 (프리베나20)
- PCV21: 2025년 8월 허가 · 2026년 3월 출시
- 국가 무료: 65세 이상 PPSV23 1회
- 위험군 19~64세: 만성질환·면역저하
- 소아 국가예방접종: 2025년 10월 PCV20 도입

vs

미국 — 질병통제예방센터·ACIP

모든 성인 접종 나이 **50세 이상**(2024 변경)

- 우선 권장 백신: PCV20 또는 PCV21
- PCV21: 2025년부터 공식 채택
- 한 번 접종을 강하게 권해 일정이 단순
- 위험군 19~49세: 만성질환·면역저하
- 소아: PCV15 또는 PCV20 사용

Tip · 한국에서는 국내 권고와 나의 위험도를 함께 보고 접종 시기를 정합니다.

근거 · 질병관리청 2024 · 미국 질병통제예방센터(CDC)·ACIP 2024~2025

아이는 생후 2개월부터 네 번

한국 국가예방접종 표준 일정과 늦게 시작했을 때의 일정

시기	접종
2개월	1차 — 다른 국가예방접종과 같은 날 가능
4개월	2차 — 약 2개월 간격
6개월	3차 — 기초 접종 완료
12~15개월	추가 1회 — 총 4회로 마무리
7~23개월 시작	7~11개월: 2회(4주 간격)+추가 1회 · 12~23개월: 2회(8주 간격)
24개월 이상	건강한 아이는 1회로 충분 · 2025년 10월부터 PCV20 무료

Tip · 아이 컨디션이 괜찮다면 일정대로 맞는 것이 면역 형성에 가장 좋습니다.



그림 · 아기는 정해진 개월 수에 맞춰 접종하고, 추가 접종으로 면역을 오래 유지합니다 (설명용 그림).

근거 · 질병관리청 2025 소아 국가예방접종 · 대한소아과학회 예방접종 지침

전에 맞은 적이 있다면?

이전 접종에 따라 다음 백신과 시기가 달라집니다

PPSV23만 맞았다면

최소 1년 뒤 PCV20 1회. 또는 PCV15 뒤 PPSV23 순서로 진행합니다.

PCV13만 맞았다면

최소 1년 뒤 PCV20 1회. 또는 권장 간격에 맞춰 PPSV23을 맞습니다.

PCV13과 PPSV23 둘 다

마지막 접종 5년 뒤 PCV20 1회를 맞을 수 있습니다.

기록 확인

예방접종도우미(nip.kdca.go.kr)나 보건소에서 내 접종 기록을 볼 수 있습니다.

? 기록이 불확실하면

의료진과 상의해 새로 1회 맞는 방법이 흔히 쓰입니다. 두 번 맞아도 큰 부작용은 드뭅니다.

간격은 최소 기준

1년·5년·8주는 최소 간격입니다. 날짜는 의료진과 함께 정하세요.

Tip · 접종 기록을 가져오시면 가장 알맞은 다음 일정을 바로 정할 수 있습니다.

근거 · 대한감염학회 2024 성인 예방접종 권고 · 질병관리청

오늘 꼭 기억할 여덟 가지

폐렴구균 백신으로 폐렴·수막염·패혈증 위험을 줄일 수 있습니다

01 폐렴구균은 지역사회 세균성 폐렴의 가장 흔한 원인균입니다

02 PCV20 한 번이 가장 간편한 선택지입니다

03 65세 이상은 무료 PPSV23 또는 본인 부담 PCV20을 꼭 맞으세요

04 만성질환·면역저하·흡연자는 19~64세라도 접종 대상입니다

05 PCV15 → PPSV23 순차 접종은 1년(면역저하 8주) 간격

06 아이는 생후 2·4·6·12~15개월 네 번(국가 무료)

07 전에 맞은 적이 있으면 의료진과 다음 일정을 정합니다

08 PCV21(캡박시브)은 2026년 3월 국내 출시된 선택지입니다

Tip · 한 번의 접종 상담으로 가족 모두의 일정을 함께 정리해 보세요.

근거 · 대한감염학회 2024 성인 예방접종 권고 · 질병관리청

다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

폐렴구균 백신 접종을 고민하는 성인과 아이의 보호자를 위한 설명자료입니다. 접종 백신과 시기는 담당 의료진과 상의해 정합니다.

참고한 자료

대한감염학회 2024 성인 예방접종 권고 · 질병관리청 국가예방접종 · 미국 CDC·ACIP 2024~2025 ·
식품의약품안전처 PCV21 허가



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요