

용종 절제술 후, 안전하게 회복하는 길

대장 용종을 떼어 낸 뒤 식사·활동·출혈 살피기·다음 검사 안내

늦은 출혈은 시술 당일보다 3~7일째에 많습니다

시술 뒤 2주까지는 스스로 살펴봐야 합니다 — 집에 왔다고 끝이 아닙니다

3~7일

출혈이 가장 많은 시기

시술 당일이 아니라 며칠 뒤

2주

스스로 살펴볼 기간

혈변·복통·어지럼을 매일 확인

1~6%

늦은 출혈이 생기는 비율

용종 크기·위치·복용약에 따라 다름

특히 조심할 분

오른쪽 대장에서 떼었거나 **20mm 이상 큰 용종**을 떼는 경우 늦은 출혈이 더 흔합니다.

매일 살펴보세요

혈변·복통·어지럼이 있는지 매일 보고, 달라지면 **바로 병원에 연락**하세요.

Tip · 퇴원할 때 받은 연락처를 2주 동안 가까이 두세요.

근거 · ESGE 2024 · USMSTF 2020 · 늦은 출혈 코호트 연구

용종 절제술 — 대장암이 되기 전에 떼어 내는 시술

대장내시경 중에 올라미·집게·열로 용종을 잘라 냅니다

왜 떼나요

대장 점막에 자란 용종을 **암으로 자라기 전에** 미리 떼어 냅니다.

회복은 빠릅니다

대부분 회복실에서 **2~4시간** 쉬고 나면 식사를 시작할 수 있을 만큼 회복됩니다.

상처가 아무는 데는 1~2주

뗀 자리는 작은 상처로 남아 점막이 다 아물 때까지 **1~2주**가 걸립니다. 이 기간에 출혈·천공(장에 구멍)이 늦게 생길 수 있습니다.

Tip · 떼어 낸 용종은 모두 조직검사로 종류를 확인합니다.





그림 · 위는 용종을 뗀 자리가 아물어 가는 모습, 아래는 물 → 죽 → 밥상으로 늘려 가는 식사입니다(설명용 그림).

근거 · ESGE 2024 · 대한소화기내시경학회 용종절제 지침

시술 뒤 식사는 한 단계씩 늘립니다

오래 굶는 것(3~5일 금식)보다 일찍 먹기 시작하는 것이 회복에 더 안전하다는 연구가 있습니다



먹다가 이상하면 멈추세요 식사 중이나 식후에 복통·혈변·어지럼이 생기면 바로 멈추고 병원에 연락하세요.

Tip · 불안하면 한 단계 전 식사로 돌아가도 됩니다(평소 식사 → 죽, 죽 → 맑은 물).

근거 · 조기 식사 재개 무작위 연구 · ESGE 2024

무엇을 주의하고, 무엇이 괜찮을까요

씨앗·견과·잡곡·해조류를 1~2주 모두 끊을 근거는 부족합니다 — 핵심은 '처음 며칠 자극 피하기'

처음 24~48시간 · 피하기

매운 음식·자극적인 양념(카레·청양고추), 과음, 진한 커피, 탄산음료, 과식은 통증·출혈 위험을 높일 수 있습니다.

2~3일 뒤부터 · 조금씩 괜찮음

씨앗·견과·잡곡·해조류가 뼚 자리를 다치게 한다는 확실한 근거는 없습니다. 증상이 없으면 평소처럼 드셔도 됩니다.

처음부터 권함 · 물과 부드러운 섬유질

물·보리차·미음·죽·삶은 채소·바나나. 변비로 힘을 주면 뼚 자리 출혈이 늘 수 있어 **변비 예방이 곧 출혈 예방**입니다.

증상이 생기면 · 바로 멈추기

먹다가 복통이 새로 생기거나 피 섞인 변·검은 변을 보면 식사를 멈추고 병원에 연락하세요.

Tip · 물을 충분히 마셔 변을 부드럽게 유지하세요.

근거 · ESGE 2024 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문

활동 제한은 짧고 분명하게

‘1~2주 모두 쉬기’는 근거가 약합니다 — 핵심은 처음 48~72시간 힘든 활동 피하기



그림 · 쉬고, 가볍게 걷고, 무거운 물건은 잠시 들지 않습니다.

1 시술 당일 **쉬기**

집에서 충분히 쉽니다. 운전·기계 조작·중요한 결정은 진정제 때문에 24시간 피합니다.

2 다음 날 **일상 활동**

가볍게 걷기·집안일·사무 업무는 괜찮습니다. 무리하지 않는 선에서.

3 48~72시간 **힘든 활동 피하기**

무거운 물건 들기·등산·헬스·골프 풀스윙·마라톤은 3일 쉽니다. 배에 힘이 들어가면 출혈 위험.

4 3~7일 뒤 **천천히 복귀**

증상이 없으면 운동·여행·비행기도 차츰 다시. 큰 용종이었다면 7일까지 조심.

Tip · 20mm 이상 큰 용종·오른쪽 대장을 떼 분은 의료진의 개별 안내를 먼저 따르세요.

근거 · ESGE 2024 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문

약은 스스로 끊지도, 스스로 다시 시작하지도 마세요

피를 묽게 하는 약과 진통제는 의료진의 개별 안내를 따릅니다 — 무조건 1주 중단은 오히려 위험할 수 있습니다

약	어떻게 하나요
아스피린만 드시는 분	대부분 끊지 않고 그대로 드시거나 곧 다시 시작합니다. 스스로 끊으면 심장·뇌혈관 위험이 더 큼니다
와파린·먹는 항응고제·항혈소판제	피가 멎은 것을 확인하면 보통 24~48시간 안에 다시 시작을 고려합니다. 시작 날짜는 시술 의사의 안내대로
아플 때 먹는 진통제	아세트아미노펜(타이레놀) 을 먼저. 이부프로펜·나프록센 같은 소염진통제는 출혈 위험이 있어 피합니다
혈압·당뇨·갑상선 약	시술과 상관없는 약은 평소대로. 시술 당일 아침 약은 미리 안내받은 대로



그림 · 먹는 약은 의사와 상의해 끊고 다시 시작합니다.

Tip · 큰 용종·오른쪽 대장을 떼 경우 다시 시작하는 시점을 더 신중히 정합니다.

근거 · BSG/ESGE 항혈전제 지침 2021 · ACG-CAG 2022

가벼운 출혈과 위험한 출혈, 이렇게 구별합니다

적은 핏기는 흔하지만 오른쪽 신호는 바로 응급실입니다

살펴볼 것	가벼운 출혈 — 병원에 연락하고 지켜보기	위험한 출혈 — 바로 응급실
피의 양	휴지에 살짝 묻거나 변에 핏줄이 한두 줄, 변기 물은 맑음	변기 물이 새빨강계 물들 만큼 많음
횟수	한두 번으로 그치고 더 나오지 않음	반복되거나 양이 점점 늘어남
색	선홍색이지만 양이 아주 적음	짜장면 같은 검은 변(위쪽 출혈일 수 있음)
몸 상태	어지러움·식은땀·복통이 없음	어지러움·식은땀·쓰러질 것 같음·창백
맥박 · 혈압	평소 범위로 안정적	맥박이 빨라지고 혈압이 떨어짐
배	새로운 통증이 없음	새로 생긴 심한 복통·팽만·딱딱함

Tip · 헛갈리면 가벼운 쪽으로 판단하지 말고 병원에 먼저 연락하세요.

근거 · ESGE 2024 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문

집에서 지킬 것과 피할 것

시술 뒤 1~2주, 회복과 출혈 예방을 위해

이렇게 하세요

회복을 돕고 출혈을 막습니다.

- 증상이 없으면 물부터 천천히 시작
- 물을 충분히 마셔 변비 막기
- 변 색깔·양·증상을 매일 확인(최소 2주)
- 처방받은 약은 안내대로 복용
- 응급 연락처를 늘 가까이

VS

이것은 피하세요

출혈 위험을 높입니다.

- 48~72시간 안의 격렬한 운동·등산·골프·헬스
- 무거운 물건 들기·배에 힘주는 동작
- 처음 24~48시간 매운 음식·과음·진한 커피
- 피를 묽게 하는 약을 스스로 끊기, 소염진통제 스스로 먹기
- '별일 아니겠지' 하며 혈변 알리기 미루기

Tip · 가벼운 걷기와 일상 활동은 다음 날부터 괜찮습니다.

근거 · ESGE 2024 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문

이럴 때는 바로 응급실로 가세요

시술 뒤 합병증의 분명한 위험 신호입니다 — 한 가지라도 있으면 지체 없이 119

변기를 새빨강게 물들이는 많은 혈변

똥 자리의 늦은 출혈입니다. 특히 시술 뒤 3~7일째에 많고 바로 처치가 필요합니다.

새로 생긴 심한 복통 · 배가 딱딱하고 부풀

똥 자리에 구멍(천공)이 났을 수 있어 바로 영상 검사와 처치가 필요합니다.

어지러움 · 식은땀 · 창백 · 쓰러짐

피를 많이 잃은 쇼크 신호일 수 있습니다. 피가 안 보여도 속에서 출혈일 수 있습니다.

38°C 이상 열 · 오한이 계속됨

똥 자리 감염·복막염일 수 있습니다. 감기로 넘기지 말고 시술 사실을 알리세요.




그림 · 많은 혈변·심한 복통이 있으면 기다리지 말고 병원으로 갑니다 (설명용 그림).

Tip · 응급실에서는 '며칠 전 대장 용종을 뗐다'고 꼭 알리세요.

근거 · ESGE 2024 · 용종절제 후 합병증 신호

조직검사 결과에 따라 다음 대장내시경 시기가 정해집니다

광교바른내과 추적 기준 — 용종 종류·크기·개수·뎀 방식에 따라 달라집니다

이번 결과	다음 검사	설명
용종 없음	5년 뒤	가족력이 있거나 증상이 달라지면 더 일찍 받을 수 있습니다
용종은 있으나 선종 아님	3~4년 뒤	과형성 용종처럼 암이 되지 않는 용종만 있었던 경우
선종 있음	2~3년 뒤	관상 선종처럼 흔한 양성 선종이 있었던 경우
고위험 선종 · 여러 개	1~2년 뒤	고도 이형성·용모 선종·10mm 이상 큰 병변·선종 5개 이상
2cm 이상을 나누어 뎀 경우	6개월 뒤	남은 조직이 없는지 짧은 간격으로 먼저 확인합니다

Tip · 나의 다음 검사 시기는 조직 결과를 보고 알려 드립니다(증상이 없다는 전제).

근거 · 원내 추적 기준(USMSTF 2020·대한소화기내시경학회 변형) · 대장용종 결과 안내문

2주 동안 살펴보면 안전하게 회복합니다

궁금한 점은 언제든지 문의해 주세요 — QR로 휴대폰에서 다시 볼 수 있습니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

대장 용종을 떼 분과 가족을 위한 회복 안내자료입니다. 약 조절과 다음 검사 시기는 담당 의사와 상의해 정합니다.

참고한 자료

ESGE 2024 · USMSTF 2020 · BSG/ESGE 항혈전제 지침 2021 · ACG-CAG 2022 항혈전제 지침 · 대한소화기내시경학회 · 광교바른내과 용종절제 후 안내문 · 광교바른내과 대장용종 결과 안내문



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 휴대폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요