

크레아틴 복용 가이드

Creatine Monohydrate — 근력운동을 하는 건강한 성인에서 가장 근거가 많은 스포츠 보충제입니다. 효과는 “운동을 대신하는 것”이 아니라, 짧고 강한 운동을 반복할 때 ATP 재생을 보조하는 쪽에 가깝습니다.

핵심 숫자만 먼저 보기

기본 유지량

3~5g

하루 1회, 매일

로딩 선택 시

20g

5g씩 4회, 5~7일

효과가 큰 운동

≤30초

반복 고강도 운동

초기 체중 증가

수분

근육 내 저장 증가

기대할 수 있는 효과와 한계



효과가 큰 경우

반복 스프린트·웨이트·점프처럼 짧고 강한 운동에서 수행능력 보조 효과가 가장 뚜렷합니다.

저항운동과 병행할 때 근력 및 체지방량 증가가 더 잘 관찰됩니다.

채식 위주 식사처럼 식이 크레아틴이 낮은 사람은 저장량 증가 폭이 클 수 있습니다.

운동 없이 복용하면 근육 증가보다 수분 증가가 먼저 보일 수 있고, 인지 기능 목적 복용은 아직 연구 단계입니다.

복용법: 단순하게 가는 것이 가장 안전합니다

방법	용량 언제 쓰나	메모
유지량부터 시작	3~5g/일 대부분의 일반 성인에게 권장	1순위
로딩 후 유지	20g/일 → 3~5g 빠른 포화가 필요할 때만 선택	속불편 ↑
타이밍	식후·운동 후 탄수화물 포함 식사와 함께 가능	꾸준함
제품 형태	Monohydrate HCl·Kre·Alkalyne보다 근거가 많음	표준

TAKE HOME

크레아틴은 “매일 3~5g + 저항운동 + 충분한 단백질/수분” 조합에서 가장 현실적인 이득을 냅니다. 고용량 로딩은 필수가 아니며, 설사·복부팽만이 있으면 2~3g씩 나눠 먹거나 유지량부터 시작하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: ISSN 2017 position stand · AIS Creatine Fact Sheet · Mayo Clinic 2026 · Nutrients 2025. 본 자료는 일반 교육용이며 개인 처방을 대체하지 않습니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/creatine-guide/

부작용·검사 해석·복용 전 상담 대상

건강한 성인이 권장량으로 복용할 때는 대체로 안전한 편이지만, 신장 질환·신장 기능 저하 위험 요인·신독성 약물 복용이 있으면 이야기가 달라집니다.

자주 묻는 부작용: 대부분은 조절 가능합니다



흔한 변화와 오해

- 체중 증가** 초기에는 근육 내 수분 저장 증가로 0.5~1kg 안팎이 늘 수 있습니다. 지방이 늘었다는 뜻은 아닙니다.
- 속불편·설사** 로딩기나 한 번에 많이 먹을 때 흔합니다. 유지량부터 시작하거나 나눠 복용하세요.
- 크레아티닌** 혈액검사 creatinine은 올라 보일 수 있어 eGFR이 낮게 계산될 수 있습니다. 검사 전 복용 사실을 알려주세요.
- 탈모** 2025년 12주 RCT에서는 DHT·테스토스테론·모발 지표 차이가 확인되지 않았습니다.

복용 전 의사와 먼저 상의해야 하는 경우

- 만성 신장질환 또는 $eGFR < 60$ — 권장량이라도 복용 전 상담이 필요합니다. $eGFR < 30$, 투석 중인 경우는 임의 복용을 피하세요.
- 당뇨·고혈압·단일 신장 — 신장 기능 저하 위험이 있으면 시작 전 creatinine/eGFR 확인이 좋습니다.
- NSAIDs를 자주 복용하거나 신장에 부담이 될 수 있는 약(일부 이뇨제·항생제·면역억제제 등)을 쓰는 경우 병용을 점검하세요.
- 임신·수유·청소년은 일반 건강기능식품처럼 단순 적용하기 어렵습니다. 제품 라벨보다 진료 상담을 우선하세요.
- 여러 보충제를 동시에 복용하면 카페인·이노 성분·간·신장 부담 성분이 겹칠 수 있습니다. 성분표를 함께 확인하세요.

진료실에서 이렇게 확인하면 안전합니다

중단하고 상담할 신호

소변량 감소, 붓기, 호흡곤란이 생기는 경우
심한 설사·복통이 반복되어 탈수가 걱정되는 경우
검사에서 creatinine 급상승 또는 eGFR 급감이 나온 경우
고용량·로딩 후 이상 증상이 생긴 경우

검사 해석 팁

검사 전 복용 사실과 하루 용량을 의료진에게 알려주세요.
creatinine 기반 eGFR은 보충제 영향으로 낮게 보일 수 있습니다.
필요 시 의료진 판단으로 **cystatin C**, 소변검사, 재검 시점 조정 등을 고려합니다.
목표는 “검사 수치를 숨기는 것”이 아니라 **실제 신장 기능을 정확히 보는 것**입니다.

ONE LINE SUMMARY

건강한 성인이라면 크레아틴 모노하이드레이트 3~5g/일이 표준입니다. 신장질환, 신장 위험 요인, 신독성 약물, 임신·수유·청소년은 “시작 전 상담”이 안전선입니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

주요 참고: ISSN 2017 · AIS 2024 · Mayo Clinic 2026 · JISSN 2025 hair-loss RCT · Frontiers in Nutrition 2024 cognition review.

제품 선택 시 단일 성분 크레아틴 모노하이드레이트, 정확한 g 단위 표기, 불필요한 복합 성분이 적은 제품을 우선 확인하세요.

UPDATED 2026-05