

장염·배탈 때 이렇게 드세요

단계식 식사 — 장염은 대부분 며칠 안에 좋아집니다. 식사는 한 칸씩, 물은 꾸준히.

식사는 한 칸씩 올립니다 매 끼마다 올리면 재발합니다



STEP 1 쉬기	STEP 2 죽·누룽지	STEP 3 흰쌀밥	STEP 4 양 늘리기
한두 끼는 쉽다. 물·보리차를 조금씩 자주 마십니다.	속이 가라앉으면 죽·누룽지를 적은 양부터 시작합니다.	죽이 괜찮으면 흰쌀밥에 아래 표의 부드러운 반찬을 곁들입니다.	여러 끼 연달아 괜찮으면 그때 양을 늘립니다.

먹어도 되는 것 · 잠시 피할 것

구분	🍴 먹어도 됩니다	🚫 당분간 피하세요
밥·곡류	죽·누룽지·흰쌀밥	잡곡, 밀가루 음식(빵·면·국수)
반찬·채소	감자·두부, 익힌 호박·가지·당근	샐러드·생야채
과일	바나나	사과·복숭아 같은 과일
그 밖	담백하게 조리한 음식	유제품(우유 등), 기름진 고기, 술

수분 보충 · FLUIDS

수분은 물·보리차로 채웁니다. 한 번에 많이보다 조금씩 자주 드세요.
이온음료는 당 때문에 설사를 늘릴 수 있습니다.
설사가 잦거나 어지러우면 약국의 경구수액제가 물보다 낫습니다.

좋아진 뒤에도 · AFTER RELIEF

“좋아진 느낌은 문턱 아래로 내려왔을 뿐입니다.” 장은 아직 회복 중이라 바로 평소처럼 먹으면 문턱을 다시 넘기 쉽습니다. 좋아진 뒤에도 조금 더 조심하면서 식사량을 천천히 늘리세요.

흔한 오해

MYTH 1

“잡곡·야채·과일은 괜찮다”

평소엔 좋지만 장염 때는 설사를 늘릴 수 있습니다. 나은 뒤에 드세요.

MYTH 2

“양배추가 위에 좋다”

장염에 도움이 된다는 근거는 없고, 오히려 가스가 차고 더부룩할 수 있습니다.

MYTH 3

“이온음료로 보충한다”

당 때문에 설사를 늘릴 수 있습니다. 물·보리차가 먼저입니다.

MYTH 4

“수액을 맞으면 낫는다”

수액은 부족한 수분· 전해질을 채워 회복을 돕는 보조 치료이며, 장염 자체를 낫게 하는 약은 아닙니다. 마실 수 있으면 입으로 먼저 보충하고, 구토·설사로 충분히 못 드시거나 탈수가 오면 수액이 회복에 큰 도움이 됩니다.

이럴 때는 다시 진료를 받으세요 · RETURN VISIT

열이 날 때

배의 한 곳이 계속 아플 때

소변이 크게 줄거나 일어설 때 어지러울 때(탈수)

소변이 거의 안 나오거나 의식이 흐려지면 — 응급실로 가세요

피가 섞인 변(혈변)을 볼 때

구토가 계속될 때

좋아지지 않고 점점 나빠질 때

해열은 타이레놀(아세트아미노펜)로 하세요. 소염진통제는 위장에 부담이 됩니다.

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — IDSA 감염성 설사 진료지침 2017 · WGO 급성 설사 지침 2012

본 자료는 장염·배탈 때의 식사를 안내하기 위한 일반 자료입니다. 나이, 임신 여부, 면역상태, 복용 중인 약, 기저질환에 따라 식사와 진료 시점이 달라질 수 있으니 진료 시 상의해 주세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/gastroenteritis-stepwise-diet/