


헬리코박터 제균 치료 안내

처방받은 약을 정해진 기간 동안 빠짐없이 드시는 것 — 치료 성공은 여기서 갈립니다.

왜 치료하나요



30% 한국 성인 감염률 · 10명 중 3명

약 6배 감염 시 위암 위험 · WHO 지정 1군 발암요인

35% ↓ 제균 후 위암 발생 · 궤양 재발도 크게 감소

없애는 것 자체가 치료입니다. 한 번 끝내면 재감염은 **연 2%** 정도로 드뭅니다.

약 드실 때 꼭 지켜주세요

정해진 시간에 드세요

위산 억제제(PPI)는 **식사 30분 전**, 항생제는 **식사 직후**에 드십니다.
매일 같은 시간에 맞추시면 가장 좋습니다.

치료 중에는 술을 드시면 안 됩니다

항생제(메트로니다졸)와 술이 만나면 심하게 두근거리고 토하거나
얼굴이 붉어집니다. **약을 다 드신 뒤 48시간까지** 금주하세요.

한 알도 거르지 마세요

빠뜨리면 균에 **내성**이 생겨 다음 치료가 훨씬 어려워집니다.
깜빡하셨더라도 다음에 두 배로 드시지 말고 진료실로 연락 주세요.

속이 편해져도 끝까지

증상이 좋아진 것과 균이 없어진 것은 다릅니다. **처방받은 날짜를 다
채우셔야** 제균이 끝납니다.

치료 일정

1

치료 시작

DAY 1

처방대로 복용 시작.
첫날부터 금주

2

복용 끝

10 - 14일

마지막 한 알까지
다 드십니다

3

기다리기

4주 이상

재검사 전 위산약은
2주 중단

4

제균 확인

요소호기검사

균이 남았으면
2차 치료로

부작용 — 이건 괜찮고, 이건 연락 주세요

흔한 반응 · 대개 괜찮습니다

- 메스꺼움 · 입맛 없음 — 식사와 함께 드시면 한결 나아집니다
- 입에서 쇠 맛이 남 — 약을 끊으면 원래대로 돌아옵니다
- 변이 검게 나옴 — 비스무트 때문이며 출혈이 아닙니다
- 가벼운 설사 · 두통 — 보통 며칠 안에 좋아집니다

10명 중 2~3명이 겪지만, 이 때문에 약을 중단하는 경우는 드뭅니다.

이럴 땐 바로 연락 주세요

- 온몸에 발진이 돋거나 심하게 가려울 때
- 물설사가 하루 6번 이상 나올 때
- 숨쉬기 힘들거나 얼굴 · 입술이 부을 때
- 눈이나 피부가 노랗게 변할 때

약국에서 지사제를 임의로 사서 드시지 마세요.

먼저 031-893-4560으로 연락 주세요.

광교바른내과

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560

근거 — 대한헬리코박터·상부위장관연구학회 임상진료지침(2022). 처방 약제와 복용 기간은 환자분마다 다를 수 있습니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobaron.com/handouts/gi/h-pylori-eradication/