

중성지방이 높다고 나왔을 때

중성지방은 술·탄수화물·단 음료·운동 부족을 보여주는 "생활습관 점수"에 가깝습니다. 150 미만은 정상, 200 이상은 높은 편, 500 이상이면 채장염을 걱정해야 하는 수치입니다.

🔍 검사 결과에서 보는 핵심

정상 <150 mg/dL	높음 ≥200 mg/dL · 생활습관부터 관리	매우 높음 ≥500 mg/dL · 채장염 주의	치료 우선순위 생활습관 약은 스타틴부터
--	---	---	---

🍷🍔 무엇이 중성지방을 올리나요

🍷 중성지방 = "생활습관 점수"	🏠 생활습관 외에도 확인할 것
술 — 음주는 중성지방을 빠르게 올립니다	당뇨병 — 혈당 조절이 잘 안 될 때
탄수화물 — 흰쌀밥·빵·면 같은 정제 탄수화물	갑상선 기능 저하 — 대사가 함께 느려질 때
단 음료·단 음식 — 과당 섭취가 많을 때	신장 질환 — 지질 대사에 영향을 줍니다
운동 부족 — 활동량이 적으면 함께 오릅니다	복용 중인 일부 약 — 진료 때 약 목록을 확인합니다

💊 치료는 생활습관이 먼저입니다



올리는 식사 vs 관리하는 식사

스타틴과 중성지방

중성지방 관리는 **생활습관 교정**이 기본입니다

약이 필요하면 스타틴부터 — 중성지방이 높아도 심장·뇌혈관 위험 감소 근거가 가장 확실한 1차 약입니다. LDL을 목표까지 낮춘 뒤 필요 시 중성지방 약을 더합니다

500 mg/dL 이상은 예외 — 채장염 위험 때문에 중성지방을 먼저 빨리 낮추는 약(페노피브레이트 등)을 우선 고려합니다

중성지방과 HDL

중성지방이 오르면 **좋은 콜레스테롤(HDL)**이 떨어지는 경향이 있습니다

운동을 하면 HDL이 오릅니다

운동은 중성지방 관리에도 함께 도움이 됩니다

⚠️ 흔한 오해 바로잡기

자주 듣는 오해	바로 알기
"지금 먹는 약이 중성지방 약이다"	중성지방이 높아도 심장·뇌혈관 위험을 줄이는 첫 번째 약은 스타틴입니다. 스타틴으로 LDL을 먼저 낮춘 뒤 필요 시 중성지방 약을 더하므로, 수치가 높게 나왔다고 스스로 복용을 중단하거나 용량을 바꾸지 마세요.
"오메가3가 고지혈증 약이다"	오메가3는 중성지방을 일부 낮추고 항염증 효과가 있지만, LDL은 낮추지 못합니다. 식품·건강기능식품·처방약으로 종류가 다르며, 일부 처방용 고용량 오메가3만 중성지방 치료에 쓰이며, 시중 영양제로 처방약과 같은 치료 효과를 기대할 수는 없습니다.

⚠️ 바로 진료가 필요한 경우

중성지방이 500 이상이라는 결과를 받았다면 다음 예약까지 기다리지 말고 진료를 받으세요. 명치·윗배가 심하게 아프면서 등으로 뻗치거나 구토·발열이 함께 있으면 채장염일 수 있어 응급실로 가세요. 수치 자체가 채장염 진단을 뜻하지는 않지만, 원인 확인과 치료 계획을 빨리 상의해야 합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2022 한국 이상지질혈증 진료지침 제5판(한국지질·동맥경화학회) · 2026 ACC/AHA 이상지질혈증 지침 · National Lipid Association 2023 Clinical Perspective(J Clin Lipidol, PMID 37271600) · Diagnosis and Treatment of Hypertriglyceridemia(Dtsch Arztebl Int 2019, PMID 31888796)

본 자료는 일반적 설명이며, 정확한 진단과 치료는 검사 결과와 병력을 확인한 의료진과의 상담을 따릅니다. 개인별 목표 수치와 약물 조정은 담당의가 결정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/high-triglycerides/

