

혈압, 이렇게 재야 정확합니다

가정혈압 (Home BP) 측정법 — 집에서 잦 혈압이 치료 판단 기준입니다. 방법에 따라 40mmHg까지 달라집니다.

먼저, 이 네 가지 숫자만 기억하세요

재기 전 30분 담배·커피·술·운동 피하기	재기 전 안정 5분 등받이 의자에 앉아서	아침·저녁 2번씩 1~2분 쉬고 한 번 더 재기	가정혈압 기준 135/85 여러 날 평균으로 판단 (mmHg)
--------------------------------------	-------------------------------------	---	---



올바른 자세 5가지 · POSTURE

1. 등은 등받이에 편안히 기대 주세요
2. 커프(팔에 감는 띠)는 심장 높이, 맨살이나 얇은 옷 위에
3. 팔은 테이블 위에 올려 힘을 빼 주세요
4. 다리는 꼬지 않고, 발바닥은 바닥에 붙여 주세요
5. 재는 동안 움직이거나 말하지 마세요

자세가 만드는 혈압 오차 (단위: mmHg)

이렇게 재면	오차	실제보다	바로잡기
등을 기대지 않고 앉으면	5~10	만큼 높게 나옴	등받이에 기대기
다리를 꼬고 앉으면	2~8	만큼 높게 나옴	발바닥은 바닥에
커프가 심장보다 낮으면 (높으면 반대)	10~40	만큼 높게 나옴	팔은 테이블 위에

누워서 재면 조금 높게 나오는 편이라 앉아서 재는 것이 기준입니다. 위팔에 감는 자동혈압계 기준이며, 손목형·손가락형은 권장하지 않습니다. 계절에 따라서도 달라지는데 여름엔 낮고 겨울엔 높은 편입니다.

매일 측정 루틴 · 4가지

1. 아침 2번 — 일어나서 1시간 안에, 소변 본 후, 아침 식사·혈압약 드시기 전
2. 저녁 2번 — 잠자리에 들기 전, 같은 팔·같은 자세로
3. 맨 처음 한 번은 양쪽 팔 모두 — 그 뒤로는 더 높게 나온 팔에서
4. 맥박이 불규칙한 분(부정맥)은 한 번에 3번 이상 재 주세요

판정 기준 · 진료 준비

1~2주 평균 **135/85mmHg** 이상이면 고혈압입니다 (위·아래 중 한쪽만 넘어도)
집에서는 병원(140/90mmHg)보다 조금 낮게 나오는 게 보통이라 기준도 낮습니다
두 번 잦 값은 평균해서 적고, 높은 낮은 골라내지 말고 그대로 기록해 주세요
혈압계가 정확한지 궁금하시면 진료 오실 때 가져오세요 — 진료실 혈압계와 비교해 드립니다

이럴 땐 응급실·당일 진료 · WARNING

가슴 통증·호흡곤란·한쪽 마비·심한 두통이 있으면 혈압 수치와 관계없이 즉시 응급실로 가세요. 이런 증상 없이 **180/120mmHg** 이상이 반복되면 당일 진료 연락을 주세요. 수치와 관계없이 **혈압약은 임의로 중단·조절하지 마세요.**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 (2022) · 가정혈압 관리지침

본 자료는 일반적인 안내이며, 환자별 목표 혈압과 측정 방법은 담당 의사와 상담해 결정하시기 바랍니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/home-bp-measurement/