

국제 전립선 증상 점수표 (IPSS)

최근 한 달 동안을 떠올리며, 문항마다 한 칸에만 ✓ 표시해 주세요.

※ 소변에 피가 섞이거나 소변볼 때 아프면 **당일 진료**, 갑자기 소변이 전혀 안 나오면 **즉시 응급실**로 가세요.

성명 _____ 생년월일 _____ 작성일 _____

1~7번 증상 칸 안 숫자 = 점수	전혀 없다	드물게 있다 (5번 중 1번)	가끔 있다 (5번 중 1, 2번)	절반 정도 (5번 중 2, 3번)	절반 이상 (5번 중 3, 4번)	항상 (거의 매번)
1. 배뇨 후 시원치 않고, 소변이 남아있는 느낌을 받는 경우가 있습니까?	0	1	2	3	4	5
2. 배뇨 후 2시간이 채 지나기 전에 또 소변을 보는 경우가 있습니까?	0	1	2	3	4	5
3. 배뇨 중 오줌줄기가 끊어졌다가 다시 힘을 주면 나오는 경우가 있습니까?	0	1	2	3	4	5
4. 소변이 마려울 때 참기가 힘든 경우가 얼마나 자주 있습니까?	0	1	2	3	4	5
5. 배뇨시 소변줄기가 약하다고 느낀 경우가 얼마나 자주 있습니까?	0	1	2	3	4	5
6. 소변이 마려운데 나오지 않고 한참 기다려야 나오는 경우가 있습니까?	0	1	2	3	4	5
7번은 횟수로 답합니다	0번	1번	2번	3번	4번	5번 이상
7. 밤에 주무시는 동안 몇 번이나 깨어서 소변을 보십니까?	0	1	2	3	4	5

8. 만일 지금 같은 배뇨상태가 계속 지속된다면 어떻게 생각되십니까?

매우 만족	만족	대체로 만족	그저 그렇다	대체로 불편	아주 불편	이 상태로는 못살겠다
0	1	2	3	4	5	6

직원용 · 채점 안내

증상 점수 (1~7번 합) _____ / 35점

삶의 질 (8번) _____ / 6점 · 합계에 넣지 않음

경증 (Mild)

0~7점

중등도 (Moderate)

8~19점

중증 (Severe)

20~35점

점수는 증상의 정도일 뿐, 진단이 아닙니다. 치료 여부와 방법은 진료 때 의사가 판단합니다.

출처 — IPSS: Barry MJ 외, J Urol 1992;148:1549 · 한국어판(타당도·신뢰도 검증): 최환락 외, 대한비뇨기과학회지 1996;37:659-665 · 문구 대조: Kim JH 외, Korean J Urol 2013;54:249

