

마그네슘이 풍부한 식품

마그네슘 (Magnesium, Mg) 의 실질적인 급원은 **씨앗·견과 > 콩류·통곡물 > 진한 녹색채소** 순입니다. 근육 경련·변비·PPI 장기 복용이 있다면 아래 식품을 매일 한 줍씩 곁들여 보세요.



한 줌의 씨앗·견과가 하루 마그네슘의 든든한 시작입니다

가장 강력한 급원 TOP 5 · mg/100g

1	치아씨 chia seed	~335 mg
2	아몬드 · 캐슈넛 almond · cashew	~270 mg
3	호박씨 볶은 것 · 생것은 더 ↑	~260 mg
4	다크초콜릿 카카오 70~85%	~230 mg
5	메밀 건조 · 통곡물	~230 mg

무가당 코코아파우더 ~500mg 으로 가장 높지만 1회 섭취량이 적어 실질 급원은 씨앗·견과입니다.

분류별 대표 식품 (가식부 100g당 대략치)

씨앗 · 견과 SEEDS · NUTS

코코아파우더 ~500 · 치아씨 ~335 · 아몬드/캐슈넛 ~270 · 호박씨 ~260 · 다크초콜릿 ~230 · 땅콩 ~170

콩류 LEGUMES

검은콩 · 대두 (건조) ~180~280 · 풋콩 ~60 · 두부 ~50 (간수 응고 시 ↑) · 병아리콩 · 렌틸 (삶은 것) ~35~50

통곡물 WHOLE GRAINS

메밀 (건조) ~230 · �트밀 (건조) ~140~180 · 현미밥 ~40~45 — 정제 곡물은 도정 중 대부분 소실

녹색채소 · 해조류 · 어류 GREENS · FISH

시금치 · 근대 (익힌 것) ~85 · 고등어 ~80~95 · 연어 ~27~30 · 건조 다시마 · 미역 매우 높음 (1회량 적음)

알아두면 좋은 점

흡수를 높이려면

통곡물 · 콩 · 씨앗의 **피트산 (phytic acid)** 이 흡수를 방해
불림 · 발효 · 조리 하면 흡수율 개선
정제 · 도정 곡물은 마그네슘이 대부분 사라집니다

상한섭취량 오해

상한섭취량 350mg/일은 보충제 · 제산제 등 식품 외 급원에만 적용
신장 기능이 정상이면 **식품으로 인한 과잉은 걱정할 필요가 없습니다** (남는 양은 소변으로 배설)

결핍 위험 · 상담 필요

PPI 장기 복용 시 저마그네슘혈증 (FDA 경고)
— 식이만으로 교정이 어려울 수 있음
만성 설사 · 흡수장애 · 알코올 과다 시 결핍 ↑
신기능 저하 시 **마그네슘 완하제 · 제산제** 주의

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일 · 공휴일 휴진

근거 — 국가표준식품성분표 · USDA FoodData Central · 보건복지부 한국인 영양소 섭취기준 (KDRIs 2020, 권장 남 350~370 / 여 280mg/일) · FDA PPI Safety Warning (2011)

함량은 품종 · 가공 · 조리에 따라 편차가 크므로 절대값보다 상대 순위로 참고하세요. 신장질환 · 심장질환 · PPI 장기 복용 등이 있으면 마그네슘 섭취 · 보충 전 상담의와 상담하세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/magnesium-rich-foods/