

알러지 비염 코 스프레이, 이렇게 사용하세요

Intranasal Spray Technique — 같은 약이라도 자세와 각도에 따라 효과가 달라집니다. 코 점막에 약이 잘 닿게 하는 4단계 자세, 그리고 효과를 유지하려면 매일 꾸준히 사용해야 하는 이유.

STEP 1 · 턱을 살짝 당기세요 — 들지 마세요 (Head Position)



왼쪽 X 약이 목으로 / 오른쪽 ✓ 약이 코 점막에

✗ 잘못된 자세 · 턱 들기


고개를 뒤로 젖히면 스프레이 병이 높게 되어 **약이 제대로 분사되지 않고**, 약이 코 점막을 지나 **목으로 흘러내립니다**.

✓ 올바른 자세 · 턱 살짝 당기기

고개를 정면 또는 **살짝 숙인 상태**로 분사해야 약이 코 안쪽 점막에 정확히 닿습니다.


STEP 2~4 · 분사 각도 → 살짝 흡입 → 매일 꾸준히 (Technique & Routine)

STEP 2 · 같은 쪽 눈 방향으로



팁을 콧구멍에 넣은 뒤, **왼쪽 콧구멍은 왼쪽 눈 쪽으로, 오른쪽 콧구멍은 오른쪽 눈 쪽으로** 살짝 틀어서 분무하세요. 콧등 가운데 (비중격)를 향하면 **코피**가 납니다.

STEP 3 · 분사 후 살짝 흡입



뿌린 직후 **입은 다물고 코로 부드럽게 들이마십니다**. 너무 세게 빨면 약이 목으로 넘어갑니다. **분사 후 1~2분**은 코를 풀지 마세요.

STEP 4 · 매일 같은 시간에



효과는 먼저 시작될 수 있지만, **충분히 좋아지는 데 며칠~수 주** 걸릴 수 있습니다. 그때그때 쓰는 약이 **아니라** 매일 1~2회 꾸준히 써야 효과가 유지됩니다. **좋아져도 임의 중단 금지**.

뿌리기 전 준비 · 알아두세요 (Before & FAQ)

뿌리기 전에 · PREPARATION

코를 풀어 콧물·점액 먼저 빼냄. **식염수 세척** 후 사용하면 약 흡수가 더 잘됩니다
새 약이거나 오래 안 쓴 약은 **제품 설명서에 적힌 횟수만큼** 허공에 분사(priming)해 안개가 나오는지 확인
분사구는 **사용 후 마른 휴지**로 닦고, 정기 세척은 **제품 설명서대로**

알아두세요 · FAQ

코피가 나면 각도 재확인. **반복되면 진료**. 코의 부드러운 부분을 **10~15분 눌러도 안 멎거나** 출혈이 많고 어지러우면 **응급실로**
안전성 — 전신 흡수가 적어 장기 사용 가능(수치는 제품마다 다름).
임신·수유 중이면 미리 상담
오트리빈 같은 **코막힘 즉효(혈관수축) 스프레이**는 다른 약 — 오래 쓰면 더 막히는 **리바운드**, 짧게만 사용

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: ARIA 2024 (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) · KAAACI 2022 알레르기비염 진료지침 · AAO-HNS 2023 Clinical Practice Guideline (Allergic Rhinitis Update) · ARIA-EAACI 비강 치료 지침 2024-2025(혈관수축제 리바운드). 본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobaron.com/handouts/medication/nasal-spray-allergic-rhinitis/