

일어설 때 핑 도는 분께

저혈압·기립성 어지럼 관리 — **혈압약을 드시지 않으면서** 일어설 때 어지러운 분을 위한 안내입니다. 고혈압 환자용 저염식 안내문과는 반대 방향이니, 혈압약을 드시는 분은 이 내용을 따르지 마세요.

생활에서 이렇게 관리하세요

매일 실천 · 4가지

1. 물은 하루 **1.5L 이상** 마시고, (고혈압이 아니라면) 너무 싱겁게 먹지 않습니다 — 심부전·신장질환 등으로 물이나 소금을 제한 중이시라면 이 조언 대신 먼저 상담하세요
2. 종아리는 제2의 심장입니다 — 까치발을 들었다가 천천히 내리는 동작을 매일 반복해 주세요
3. 압박스타킹도 도움이 됩니다
4. 자세는 천천히 바꾸고, 사우나나 오래 서 있는 것은 피합니다

헛갈리기 쉬운 것들

저염식이 누구에게나 좋은 것은 아닙니다 — 기립성 저혈압에서는 상태에 따라 염분 섭취를 조절합니다

물만 마시고 식사를 거르지 않습니다 — 조금씩 자주 드세요

이온음료보다 물이 우선입니다 — 제품에 따라 당분(액상과당)이 들어 있습니다

빙빙 도는(회전성) 어지럼은 혈압보다 귀 문제인 경우가 많습니다 — 양상을 진료 때 알려주세요

승압제(혈압을 올리는 약)는 부작용이 많아 특별한 경우가 아니면 잘 사용하지 않습니다 — 생활습관 관리를 먼저 시도합니다.

핑 돌 때 대처 · 진료가 필요한 경우

핑 돌면 넘어지지 않도록 그 자리에서 바로 안전하게 앉거나 누우세요. 쪼그려 앉기는 안전하게 할 수 있을 때만 하세요. 아래에 해당하면 생활습관 관리만으로 넘기지 말고 진료를 받아 주세요.

누워 있거나 앉아 있을 때, 운동 중에, 전조 없이 쓰러진 실신은 응급실에서 평가가 필요합니다
생활습관 관리로 나아지지 않거나 자주 쓰러진다면 추가 평가·치료가 필요할 수 있습니다

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한고혈압학회 2022 고혈압 진료지침 · 2018 ESC 실신(Syncope) 가이드라인 · Autonomic Neuroscience 2020(비약물 기립성 저혈압 관리)

본 자료는 혈압약을 복용하지 않는 분의 저혈압·기립성 어지럼 관리를 위한 일반적 안내입니다. 어지럼의 원인과 개인별 관리 방법은 담당 의사와 상담해 결정하시기 바랍니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/orthostatic-dizziness-low-bp/