

위내시경 후 주의사항 (조직검사·CLO 검사)

위내시경 중 조직검사 (Biopsy) 또는 CLO (헬리코박터 신속검사)를 받으신 분을 위한 안내입니다. 떼낸 자리는 1-2일에 걸쳐 아물어 식이·약물에 짧은 제한이 있고, 결과 (특히 헬리코박터 양성 시 제균 치료)는 별도 안내드립니다.

즉시 119 또는 응급실 · 광교바른내과 ☎ 031-893-4560

- 1. 토혈 또는 커피찌꺼기 색 구토** — 피가 섞인 토, 짙은 갈색 구토물. 조직 떼낸 부위 출혈 의심 신호.
- 2. 검은 변 (흑색변)** — 평소와 다른 끈적한 검은 변. 위장 출혈 가능성.
- 3. 심한 가슴·복통이 지속·악화** — 만지면 더 아픈 부위, 펴기 어려운 자세. 천공 (드물지만 가능) 신호.
- 4. 어지러움·식은땀·실신** — 일어날 때 잡아야 하는 정도. 즉시 119, 보호자 동반.
- 5. 38°C 이상의 발열·오한** — 떨림 동반, 감염 가능성.



위 점막에서 떼낸 작은 자리가 약 1-2일 동안 아물입니다 — 식이·NSAIDs 제한이 필요한 이유입니다.

식이 · 활동 (1주)

- 1. 시술 당일~Day 1-2** — 진정 회복 1-2시간 후 미음·죽 → 부드러운 식이 (연두부·흰살생선·삶은 채소). 음주·카페인·자극·뜨거운 음식 X.
- 2. Day 3-7** — 점차 일반 식이. 자극·매운·튀김·날 음식·알코올은 1주 회피 권장.
- 4. 활동 제한** — 진정 후 운전 24시간 X. 격렬 운동·사우나·찜질방·무거운 물건 1-2일 X. 인후통은 1-2일 정상 (찬 음료·아이스크림 도움).

약물 재개 — 의사 지시 우선

- 1. 항혈전제 (피를 묽게 하는 약)** 드시는 분 — 아스피린·플라빅스·와파린·자렐토·엘리퀴스·프라다кса 등. **시술 의사 진료실에서 받으신 재개 시점을 따르세요.** 헛갈리시면 광교바른내과 ☎ 031-893-4560 전화 확인.
- 2. 진통제는 아세트아미노펜 (타이레놀) 권장** — NSAIDs (이부프로펜·낙센·디클로페낙)는 출혈 위험 ↑ **1주 회피.** 평소 위장약 (PPI·H2)은 평소대로 복용.

결과 통보 · 헬리코박터 (H. PYLORI) 양성 시 제균 치료

- 1. 조직검사 결과 (Biopsy)** — 위염·궤양·헬리코박터·종양을 확인. 결과 **1-2주 후** 통보, 못 받으시면 클리닉 전화. 다음 위내시경은 결과에 따라 1-2년 (의사 안내).
- 2. CLO 검사 (헬리코박터 신속검사)** — 당일~며칠 내 결과. **양성 = 헬리코박터 파일로리균 감염.**
- 3. H. pylori 양성 시 제균 치료** — 항생제 2종 + 위산 억제제 (PPI) **1-2주 복용** (1차 또는 4제 요법). 빠뜨림 없이 복용 = 성공률 ↑. 페니실린 알러지 미리 알림. **4주 뒤** 우레아 호기 검사로 박멸 확인.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 소화기내과 전문

검사 잘 받으셨습니다. 본 안내는 조직검사·CLO 검사 받으신 분 권고로, 환자별 상황에 따라 다를 수 있습니다. 응급 신호 시 즉시 연락, 결과는 통보드리겠습니다.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-egd-biopsy/ 집에서 다시 보기

