

갑상선 호르몬제 복용법

썬지로이드, 썬지록신 등 레보티록신은 “얼마나 먹는가”만큼 “언제, 무엇과 떨어뜨려 먹는가”가 중요합니다. 기본 원칙은 아침 공복, 물만, 30~60분 금식 유지입니다.



MOST IMPORTANT RULE

반드시 공복에 따로 복용하세요

30~60 분 이상

약을 삼킨 뒤에도 물 외에는 드시지 말고, 아침식사·커피·우유·영양제는 뒤로 미뤄 주세요.

1

기상 직후

물 한 컵과 함께 1회 복용. 다른 약은 같이 삼키지 않습니다.

2

7~8시 전후

아침 시간대가 몸의 갑상선 호르몬 리듬과 가장 잘 맞습니다.

3

30~60분 뒤

식사·커피 시작. 가능하면 매일 같은 간격을 유지합니다.

한눈에 보는 복용 간격 (Daily Timing)

BEST TIME

아침 공복

기상 직후, 물만 허용

AFTER PILL

30~60분

식사·커피·우유 금지

SEPARATE

4시간

철분·칼슘·제산제·종합비타민

BLOOD TEST

복용 전

가능하면 오전, 같은 조건

이렇게 드세요 vs 피하세요 (Do & Don't)

권장 행동 · DO

- 매일 같은 시간 — 특히 갑상선암 수술 후 TSH 목표가 있는 분은 더 중요합니다.
- 물로만 삼키기 — 커피, 주스, 우유, 두유와 함께 복용하지 않습니다.
- 아침식사는 30~60분 뒤(가능하면 1시간) — 바쁜 약부터 먹고 씻기·준비 시간을 활용하세요.

흡수 방해 · DON'T

- 식사 직후·커피 직후 복용 금지 — 흡수가 줄어 TSH가 흔들릴 수 있습니다.
- 철분제·칼슘제·마그네슘·종합비타민 — 최소 4시간 분리합니다.
- 제산제·위장약·담즙산 결합제·수크랄페이트 — 새 약 시작 전 함께 복용 가능 여부를 확인하세요.
- 용량 임의 변경 금지 — 변경 후 보통 6~8주 뒤 혈액검사로 조정합니다.
- 증상은 참고만 — 부족(피로·변비)·과함(두근거림·불면)이 있어도 스스로 용량을 바꾸지 마세요.

왜 아침 공복을 기본으로 권하나요? (Evidence)

몸의 리듬과 일관성

갑상선 축은 하루 리듬이 있어 TSH는 밤에, T4·T3는 아침에 피크로 보고됩니다(제한된 자료).
아침 7~8시 복용은 공복 간격을 지키기 쉽고 흡수 저하도 줄입니다.
TSH만 살짝 낮다면 2~3개월 뒤 재검사부터 합니다.

저녁 복용은 언제 대안인가

저녁식사 후 3~4시간 공복을 지키면 취침 전 복용도 대안입니다.
연구 결과는 엇갈립니다. 야식·영양제가 잦다면 아침 공복이 안전합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: ATA Hypothyroidism Guideline 2014 · AACE Patient Journey · Bach-Huynh et al., JCEM 2009 · Bolk et al., Arch Intern Med 2010 · Endocrine Reviews 2025 · 유럽갑상선학회(ETA) 레보티록신 지침 2025 · 대한갑상선학회 무증상 갑상선기능저하증 권고안 2023 · AACE-ATA 성인 갑상선기능저하증 지침 2012. 본 자료는 일반 복약 안내이며 개인 처방은 담당 의사의 지시를 우선합니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/thyroid-hormone-taking/