

감량의 끝은 유지의 시작

체중이 내려간 뒤가 진짜 치료입니다. 정체기, 외식, 운동, 중단 계획을 미리 설계해야 요요를 줄일 수 있습니다.

가장 오래 남는 것은 루틴입니다

약의 효과가 좋아도 걷기, 근력, 단백질, 수면이 빠지면 유지가 흔들립니다.

유지기는 더 많이 참는 시기가 아니라 **최소 루틴을 자동화**하는 시기입니다. 바쁜 주에도 지킬 수 있는 바닥선을 정하세요.

MINIMUM

최소 운동

식후 걷기 10분 또는 하루 총 20분.

PROTEIN


단백질

매끼 단백질 먼저, 빠지는 끼니는 대체식보다 실제 음식 우선.

SLEEP


수면

수면 부족은 식욕 반동과 야식 욕구를 키웁니다.



정체기는 실패가 아니라 몸의 적응입니다

체중이 멈추면 약 실패로 단정하기보다 기록, 식사, 활동량, 수면을 같이 봅니다.



정체기 점검

체중이 2-4주 멈추는 시기는 흔합니다. 이때 무리하게 굶기보다 허리둘레, 식사 기록, 활동량을 점검합니다.

CHECK 1

기록

간식·음주·외식 빈도가 늘었는지 확인합니다.

CHECK 2

활동량

체중이 줄며 일상 소모량이 함께 줄 수 있습니다.

CHECK 3

진료 상담

증량, 유지, 휴약, 다른 질환 평가는 진료에서 결정합니다.

감량 후에는 근력운동을 더 빼면 안 됩니다

체중이 줄수록 근육은 대사와 자세를 지키는 핵심 자산입니다.

유지기에는 운동을 늘리기보다 **끊이지 않는 주 2회**가 더 중요합니다.
걷기와 근력운동을 묶어 한 루틴으로 만듭니다.

PAIR

걷기+근력

걷기 20분 뒤 의자 스쿼트와 벽 푸시업을 붙입니다.

LOAD

강도

통증 없이 쉽다면 세트 수를 하나 늘립니다.

MEASURE

체크


체중보다 허리둘레와 계단 오르기 편안함을 봅니다.



근력 유지

회식·명절·여행은 예외가 아니라 계획 대상입니다

완벽히 피하는 전략보다 회복이 빠른 전략이 오래갑니다.



외식·회식

한 끼가 흐트러져도 다음 끼에서 회복하면 됩니다. 치료를 망치는 것은 한 번의 외식이 아니라 **포기 모드**입니다.

BEFORE

전

굵고 가지 말고 단백질 간식을 작게 먹습니다.

DURING

중

처음부터 덜어먹고, 술은 천천히 뜨는 줄입니다.

AFTER

후

다음 날 보상 굶기보다 걷기와 평소 식사로 복귀합니다.

이번 회차는 3개월 유지 계획

이번 주는 다음 3개월 동안 유지할 최소 루틴을 정합니다.

01 유지는 의지보다 **최소 루틴**이 결정합니다.

03 근력운동은 감량 후에도 계속 필요합니다.

02 정체기는 실패가 아니라 점검 신호입니다.

04 회식 후에는 보상 굶기보다 다음 루틴으로 복귀합니다.

PHONE

031-893-4560

ADDRESS

경기 용인 수지구
광교중앙로 298, 4층

SPECIALTY

소화기내과 · 일반내과
5대암 검진



SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요