

# 당뇨 환자를 위한 식이요법 가이드

당뇨 식이요법 (Diabetes MNT, Medical Nutrition Therapy) — 식사 구성을 바꾸면 HbA1c를 평균 1~2% 낮출 수 있습니다. 한국인 식사 기준 핵심 수치와 접시법, 식품 선택 가이드를 한 장에 정리했습니다.



## 한눈에 보는 혈당 목표 (Glycemic Targets)

당화혈색소 (HBA1C)

**<7.0**

% (대다수 성인 목표)

공복혈당 (FPG)

**80~130**

mg/dL (식전)

식후 2시간 혈당

**<180**

mg/dL (PPG)

탄수화물 1회분

**45~60**

g / 끼 (밥 ⅓공기 수준)

## 당뇨 접시법 (Diabetes Plate Method · ADA)

½ 접시 · 채소

잎채소·브로콜리·오이·가지·버섯 등  
**비전분 채소**로 절반을 채웁니다.  
식이섬유가 혈당 상승을 완만하게  
합니다.

¼ 접시 · 단백질

생선·닭가슴살·두부·계란·콩류 등 **저지방  
단백질**로 ¼을 채웁니다. 가공육·튀김은  
피합니다.

¼ 접시 · 탄수화물

현미·잡곡밥·고구마·통곡빵 등 **복합  
탄수화물**로 ¼만 채웁니다. 흰쌀·흰빵은  
줄입니다.

먹는 순서도 중요 — **채소 → 단백질 → 탄수화물** 순서로 먹으면 식후 혈당 피크가 더 낮습니다.

## 식품 선택 가이드 (Do & Don't)

권장 식품 · DO

1. 잡곡밥·현미밥 — 흰쌀밥보다 GI 20~30 낮음
2. 비전분 채소 매끼 ½접시 — 식이섬유 풍부
3. 생선·두부·콩류 단백질 — 포화지방 적음
4. 견과류 1줌 (30g/일) — 호두·아몬드, 무염
5. 물 하루 1.5~2L — 음료 대신 물·녹차
6. 식초·레몬·계피로 맛내기 — 혈당 완화
7. 천천히 20분 이상 꼭꼭 씹어 먹기

주의 식품 · DON'T

1. 흰쌀밥·흰빵 과다 — GI 70+, 혈당 급상승
2. 단 음료 (주스·탄산·꿀물) — 즉각 혈당 ↑
3. 떡·죽·국수 단독 — 단순당, GI 높음
4. 야식·심야 간식 — 야간 혈당·체중 증가
5. 튀김·가공육 — 인슐린 저항성 ↑
6. 시럽·꿀·과당 시럽 — "건강해 보여도" 같음
7. 빈속 과일·말린 과일 과다 — 과당 농축

인슐린·SU 복용 중인 분 · IMPORTANT

인슐린·설폰닐우레아(아마릴·다오닐 등) 복용 중에 식사를 거르거나 탄수화물을 갑자기 크게 줄이면 **저혈당(혈당 <70mg/dL)**  
— 식은땀·떨림·어지러움 등이 생길 수 있습니다. 사탕 3~4개 또는 주스 100ml로 즉시 회복시키고, 반복되면 외래로 연락  
주세요. 식이 변경 전 약 용량 점검이 필요합니다. ☎ 031-893-4560

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한당뇨병학회 진료지침 2023 · ADA Standards of Care in Diabetes 2024

본 자료는 일반적 권고이며, 환자별 약 용량·합병증·신기능에 따라 달라질 수 있습니다. 다음 장에 한국 주식의 GI/GL과 1회분 가이드, 과일·술·간식 전략이  
이어집니다.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → [edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/diabetes-diet/](http://edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/diabetes-diet/)

## 한국 주식의 혈당지수(GI)와 1회 분량 가이드

밥·면·빵의 GI/GL, 과일·감미료·술의 안전 분량을 정리했습니다.

### 한국인 주식의 GI/GL과 1회분 (탄수화물 ~50g 기준)

| 식품                | GI | 1회분 (탄수 G)     | 혈당부하 (GL) |
|-------------------|----|----------------|-----------|
| 흰쌀밥               | 86 | ½공기 140g (45g) | 39        |
| 잡곡밥 (현미·보리)       | 55 | ½공기 140g (45g) | 25        |
| 흰식빵               | 75 | 2쪽 (50g)       | 19        |
| 통곡빵 (whole grain) | 53 | 2쪽 (50g)       | 13        |
| 국수 (우동·칼국수)       | 62 | 1그릇 (60g 면)    | 28        |
| 고구마 (찐 것)         | 55 | 중 1개 (150g)    | 17        |

#### 과일 — OK 분량 VS 제한

**OK · 1회분 (탄수 15g):** 사과 ½개·배 ½개

**OK:** 딸기 7알·블루베리 ¼컵·자두 2개

**OK:** 토마토·방울토마토 (비제한, GI 낮음)

**제한:** 수박·파인애플 — GI 높음, 소량만

**제한:** 포도·감 — 당도 높음, ½회분

**금지:** 과일주스·말린 과일·통조림

**팁:** 빈속 x, 식후 또는 견과류와 함께

#### 설탕 대체 감미료 (SWEETENERS)

**안전 (혈당 영향 없음):** 스테비아·에리스리톨

**안전:** 알룰로스·몽크프루트 (천연 유래)

**주의:** 자일리톨·말티톨 (다량 시 설사)

**피하기:** 꿀·시럽·아가베 — 사실상 설탕

**피하기:** "무가당" 표시여도 과당·말토덱스트린 확인

**커피·차:** 무가당 또는 스테비아 1포

**제로 음료:** 가끔 OK, 매일 권장 X

#### 술 (ALCOHOL) — 안전 분량과 주의

**최대:** 남 2잔/일, 여 1잔/일

**1잔:** 소주 50ml·맥주 350ml·와인 150ml

**빈속 음주 금지** — 저혈당 위험 (인슐린·SU)

**맥주·막걸리:** 탄수화물 多, 1잔만

**음주 후** 새벽 저혈당 — 자기 전 혈당 확인

#### 간식·야식 전략 (SNACKING)

**원칙:** 끼니 거르지 않으면 간식 불필요

**OK (탄수 15g 이내):** 무가당 요거트

**OK:** 견과류 1줌·삶은 계란·치즈 1조각

**야식 금지** — 저녁 후 4시간 공복

**식후 30분 산책** — 혈당 피크 완화

### 당뇨 하루 식단 예시 (탄수 ~150g/일)

**아침 ~45G** 잡곡밥 ½공기 · 두부조림 · 시금치나물 · 김치 · 사과 ½개 — 채소·단백질 먼저

**점심 ~50G** 현미밥 ½공기 · 닭가슴살 샐러드 · 미역국 · 나물 2종 — 외식 시 면보다 백반

**저녁 ~45G** 잡곡밥 ½공기 · 흰살생선구이 · 브로콜리 · 김치 · 견과 1줌 — 식후 30분 산책