

인슐린 주사, 처음 시작하시는 분께

Insulin Injection — 첫 자가 주사를 시작하는 당뇨 환자를 위한 5가지 핵심(보관·소독·부위·회전·용량). 통증을 줄이고 공복혈당에 따라 안전하게 용량을 맞춰 가세요.

한눈에 보는 인슐린 시작 수칙 (Key Numbers)

시작 용량 10 단위 / 일 (저녁 또는 자기 전 1회)	공복혈당 목표 80~130 mg/dL (FBS · 아침 식전)	증량 기준 > 140 mg/dL × 3~4일 연속 시 +2단위	주사 간격 2~3 cm 떨어뜨려 매번 위치 회전
---	--	---	--

통증을 줄이는 주사 전 3가지 준비 (Before Injection)

1. 냉장 → 상온 (30분 전)

인슐린은 **냉장 보관 (2~8°C)**. 차가운 채로 맞으면 통증이 큼니다. **30분 전 꺼내 상온에 둔 뒤 사용** (사용 중인 펜은 상온 28일).

2. 알코올 소독 + 완전 건조

알코올 솜으로 닦은 뒤 **완전히 마를 때까지 (약 10초)** 기다림. 알코올이 남은 채 찌르면 따끔거림이 강해집니다.

3. 피부 집고 90° 직각



피부를 살짝 집어 **5~10초 유지** 후 뽑니다. 바늘은 한 번만 사용.

주사 부위 — 어디에 맞고, 어디는 피하나요? (Where to Inject)



권장 4부위 · 배꼽 5cm 회피

권장 부위 · DO (피하 지방이 두꺼운 곳)

- ① 복부 (배꼽 5cm 바깥) — 흡수 가장 빠름, 1순위
- ② 허벅지 앞·바깥쪽 — 무릎 위 한 뼘 ~ 사타구니 한 뼘 아래
- ③ 둔부 위쪽 바깥 — 흡수 느려 야간 기저인슐린 적합
- ④ 상완 뒤·바깥쪽 — 보호자 도움 권장

피해야 할 부위 · DON'T

배꼽 5cm 이내(혈관 多) · 같은 자리 반복(지방위축) · 명·붓기 · 딱딱한 부위 · 운동 직후 · 옷·벨트 조이는 자리



매번 2~3cm 떨어뜨려 회전

용량 조절 규칙 + 즉시 진료가 필요한 경우 (Titration & Red Flags)

2단위씩 증량하는 법 · TITRATION RULE

1. 10단위로 시작 — 저녁 또는 자기 전 1회, 매일 같은 시간
2. 매일 아침 공복혈당(FBS) 측정·기록 — 식사·물 섭취 전
3. FBS > 140 이 3~4일 연속 → 다음 날부터 +2단위 증량 (10→12→14...)
4. FBS 80~130 들어오면 유지, 저혈당(<70) 시 -2단위 + 진료 문의

즉시 당원 섭취 + 진료 (HYPOGLYCEMIA / RED FLAGS)

1. 저혈당 증상 — 식은땀·손떨림·어지럼·심한 공복감 → 사탕 3개 / 주스 1컵 즉시
2. 의식 저하·경련 — 즉시 119, 가족이 있다면 글루카곤 주사
3. 발열·구토·설사로 식사 못 할 때 — 인슐린 임의 중단 금지, 전화 문의 후 조정

