

용종절제술 후 주의사항

용종절제술 (Polypectomy, 대장 안의 혹을 떼어내는 시술) 후 절제 부위는 1-2주에 걸쳐 아물어, 일반 대장내시경 후보다 식이·활동·약물 제한이 길고 지연 출혈 신호 인지가 중요합니다.

즉시 119 또는 응급실 · 광교바른내과 ☎ 031-893-4560

- 1. 다량의 혈변·검은 변** — 휴지에 묻는 정도가 아니라 변기에 흘러내릴 정도의 **빨간 피**, 또는 커피찌꺼기 색의 검은 변. 시술 후 2주 이내라면 지연 출혈 가능성.
- 2. 평소보다 훨씬 심한 복통** — 만지면 더 아픈 배, 누우면 퍼지지 않는 자세, 점점 심해지는 통증. 천공 (Perforation, 장벽에 구멍) 가능성.
- 3. 어지러움·식은땀·실신** — 의자에서 일어날 때 잡아야 하는 정도, 손발 차갑고 식은땀, 의식이 흐려짐. 출혈성 쇼크 의심 신호 — 즉시 119, 보호자 동반.
- 4. 38°C 이상의 발열·오한** — 단순 미열 아니라 떨림 동반. 감염·합병증 가능성.



용종을 떼낸 자리는 약 1-2주에 걸쳐 아물니다 — 그동안 식이·약물에 주의해 주세요.

식이 · 활동 제한 (1-2주)

- 1. 시술 당일~1-2일** — 미음·죽 → 부드러운 식이 (연두부·흰살생선·삶은 채소). 평소 양의 2/3. 음주·카페인·탄산 X.
- 2. 7-10일** — 자극적·매운 음식·튀김·날 음식 (회·육회)·알코올 회피.
- 4. 활동 제한** — 진정 내시경 후 운전 24시간 X. 격렬한 운동·사우나·찜질방·무거운 물건 들기·장거리 항공 **1주일 X** (출혈 위험).

약물 재개 — 의사 지시 우선

- 1. 항혈전제 (피를 묽게 하는 약)** 드시는 분 — 아스피린·플라빅스·와파린·자렐토·엘리퀴스·프라다кса 등. **시술 의사 진료실에서 받으신 재개 시점**을 따르세요. 헛갈리시면 광교바른내과 ☎ 031-893-4560 전화 확인 (자가 판단 X).
- 2. 진통제는 아세트아미노펜 (타이레놀) 권장** — NSAIDs (이부프로펜·낙센·디클로페낙)는 출혈 위험을 높여 **1-2주 회피**.

조직검사 결과 · 다음 대장내시경 시점

- 1. 조직검사 (Biopsy) 결과** — 떼어낸 용종은 현미경 검사로 종류·위험도를 확인합니다. 결과는 약 **1-2주 후** 외래 또는 전화로 통보. 결과를 받지 못하셨다면 **반드시 클리닉으로 전화**해 확인하세요 (분실·누락 방지).
- 2. 다음 대장내시경 시점** — 폴립의 크기·개수·조직형에 따라 **1년 / 3년 / 5년 / 7-10년** 등 다양합니다. 대부분 3-5년, 저위험 7-10년, 고위험 (큰 폴립·다수·고이형성도) 1-3년. **정확한 시점은 조직검사 결과를 보고 의사가 안내**합니다 (자료의 일반 범위를 본인 시점으로 가정 X). 결과·예약 안내는 카톡·문자 발송.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 소화기내과 전문

용종 절제 잘 받으셨습니다. 1-2주 잘 회복하시고, 조직검사 결과는 통보드리겠습니다. 본 안내는 일반 권고로 환자별 상황 (폴립 크기·개수·복용약)에 따라 달라질 수 있으니 응급 신호 시 즉시 연락 주세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/post-polypectomy/