

갑상선 호르몬제 복용법

썬지로이드, 썬지록신 등 레보티록신은 “얼마나 먹는가”만큼 “언제, 무엇과 떨어뜨려 먹는가”가 중요합니다. 기본 원칙은 아침 공복, 물만, 30~60분 금식 유지입니다.



MOST IMPORTANT RULE

반드시 공복에 따로 복용하세요

30~60 분 이상

약을 삼킨 뒤에도 물 외에는 드시지 말고, 아침식사·커피·우유·영양제는 뒤로 미뤄 주세요.

1

기상 직후

물 한 컵과 함께 1회 복용. 다른 약은 같이 삼키지 않습니다.

2

7~8시 전후

아침 시간대가 몸의 갑상선 호르몬 리듬과 가장 잘 맞습니다.

3

30~60분 뒤

식사·커피 시작. 가능하면 매일 같은 간격을 유지합니다.

한눈에 보는 복용 간격 (Daily Timing)

BEST TIME

아침 공복

기상 직후, 물만 허용

AFTER PILL

30~60분

식사·커피·우유 금지

SEPARATE

4시간

철분·칼슘·제산제·종합비타민

BLOOD TEST

복용 전

가능하면 오전, 같은 조건

이렇게 드세요 vs 피하세요 (Do & Don't)

권장 행동 · DO

- 매일 같은 시간 — 특히 갑상선암 수술 후 TSH 목표가 있는 분은 더 중요합니다.
- 물로만 삼키기 — 커피, 주스, 우유, 두유와 함께 복용하지 않습니다.
- 아침식사는 30~60분 뒤 — 바쁘면 약부터 먹고 씻기·준비 시간을 활용하세요.

흡수 방해 · DON'T

- 식사 직후·커피 직후 복용 금지 — 흡수가 줄어 TSH가 흔들릴 수 있습니다.
- 철분제·칼슘제·마그네슘·종합비타민 — 최소 4시간 분리합니다.
- 제산제·위장약·담즙산 결합제·수크랄페이트 — 새 약 시작 전 함께 복용 가능 여부를 확인하세요.
- 용량 임의 변경 금지 — 변경 후 보통 6~8주 뒤 혈액검사로 조정합니다.

왜 아침 공복을 기본으로 권하나요? (Evidence)

몸의 리듬과 일관성

갑상선 축은 하루 리듬이 있습니다. TSH는 밤에 오르고, 제한된 자료에서 T4·T3는 아침 피크가 보고됩니다.
아침 7~8시 전후 복용은 공복 간격을 만들기 쉽고, 음식·커피로 인한 흡수 저하를 줄입니다.

저녁 복용은 언제 대안인가

취침 전 복용도 대안은 될 수 있습니다. 단, 저녁식사 후 최소 3~4시간 공복을 매일 지킬 수 있어야 합니다.
연구 결과는 엇갈립니다. 일부 연구는 저녁 흡수가 좋았지만, 다른 연구에서는 아침 공복군의 TSH 변동 폭이 더 좁았습니다. 야식·영양제·위장약이 잦다면 아침 공복이 더 안전합니다.

