크레아틴 복용 가이드

크레아틴 모노하이드레이트(Creatine Monohydrate) — 근력운동을 하는 건강한 성인에서 가장 근거가 많은 스포츠 보충제입니다.
효과는 "운동을 대신하는 것"이 아니라, 짧고 강한 운동을 반복할 때 근육의 에너지원(ATP) 재생을 보조하는 쪽에 가깝습니다.

핵심 숫자만 먼저 보기

항목	숫자	뜻
기본 유지량	**3~5g**	하루 1회, 매일
로딩 선택 시	**20g**	5g씩 4회, 5~7일
효과가 큰 운동	**30초 이내**	반복 고강도 운동
초기 체중 증가	**수분**	근육 내 저장 증가

기대할 수 있는 효과와 한계



짧고 강한 운동을 반복할 때 효과가 가장 뚜렷합니다

효과가 큰 경우 · 한계

반복 스프린트·웨이트·점프처럼 짧고 강한 운동에서 수행능력 보조 효과가 가장 뚜렷합니다.

저항운동과 병행할 때 근력 및 제지방량 증가가 더 잘 관찰됩니다.

채식 위주 식사처럼 식이 크레아틴이 낮은 사람은 저장량 증가 폭이 클 수 있습니다.

운동 없이 복용하면 근육 증가보다 수분 증가가 먼저 보일 수 있고, 인지 기능 목적 복용은 아직 연구 단계입니다.

복용법: 단순하게 가는 것이 가장 안전합니다

방법	용량	언제 쓰나	메모
유지량부터 시작	**3~5g/일**	대부분의 일반 성인에게 권장	**1순위**
로딩 후 유지	**20g/일 → 3~5g**	빠른 포화가 필요할 때만 선택	**속불편↑**
타이밍	**식후·운동 후**	탄수화물 포함 식사와 함께 가능	꾸준함
제품 형태	**모노하이드레이트**	다른 형태(염산염·완충형 제품 등)보다 근거가 많음	표준

TAKE HOME

크레아틴은 "매일 3~5g + 저항운동 + 충분한 단백질/수면" 조합에서 가장 현실적인 이득을 냅니다. 고용량 로딩은 필수가 아니며, 설사·복부팽만이 있으면 2~3g씩 나눠 먹거나 유지량부터 시작하세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: ISSN 2017 position stand · AIS Creatine Fact Sheet · Mayo Clinic 2026 · Nutrients 2025. 본 자료는 일반 교육용이며 개인 처방을 대체하지 않습니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/creatine-guide/

부작용·검사 해석·복용 전 상담 대상

건강한 성인이 권장량으로 복용할 때는 대체로 안전한 편이지만, 신장 질환·신장 기능 저하 위험 요인·신장에 부담을 주는 약(신독성 약물) 복용이 있으면 이야기가 달라집니다.

❓ 자주 묻는 부작용: 대부분은 조절 가능합니다

흔한 변화와 오해	이렇게 이해하세요
체중 증가	초기에는 근육 내 수분 저장 증가로 0.5~1kg 안팎이 늘 수 있습니다. 지방이 늘었다는 뜻은 아닙니다.
속불편·설사	로딩기나 한 번에 많이 먹을 때 흔합니다. 유지량부터 시작하거나 나눠 복용하세요.
크레아티닌	혈액검사의 크레아티닌(콩팥 기능 수치)은 올라 보일 수 있어 사구체여과율(eGFR, 콩팥 기능 추정치)이 낮게 계산될 수 있습니다. 검사 전 복용 사실을 알려주세요.
탈모	2025년 12주 무작위 대조 연구에서는 탈모 관련 호르몬(DHT)·테스토스테론·모발 지표 차이가 확인되지 않았습니다.

🫘 복용 전 의사와 먼저 상의해야 하는 경우

해당하면	이렇게 하세요
1. 만성 신장질환 또는 eGFR <60	권장량이라도 복용 전 상담이 필요합니다. **eGFR <30, 투석 중인 경우는 임의 복용을 피하세요.**
2. 당뇨·고혈압·단일 신장	신장 기능 저하 위험이 있으면 시작 전 크레아티닌·eGFR 확인이 좋습니다.
3. 소염진통제(NSAIDs)를 자주 복용	신장에 부담이 될 수 있는 약(일부 이뇨제·항생제·면역억제제 등)을 쓰는 경우 병용을 점검하세요.
4. 임신·수유·청소년	일반 건강기능식품처럼 단순 적용하기 어렵습니다. 제품 라벨보다 진료 상담을 우선하세요.
5. 여러 보충제를 동시에 복용	카페인·이뇨 성분·간/신장 부담 성분이 겹칠 수 있습니다. 성분표를 함께 확인하세요.

🩺 진료실에서 이렇게 확인하면 안전합니다

중단하고 상담할 신호	검사 해석 팁
• **소변량 감소, 붓기, 호흡곤란**이 생기는 경우 • **심한 설사·복통**이 반복되어 탈수가 걱정되는 경우 • **검사에서 크레아티닌 급상승** 또는 eGFR 급감이 나온 경우 • **고용량·로딩 후 이상 증상**이 생긴 경우	• **검사 전 복용 사실**과 하루 용량을 의료진에게 알려주세요. • **크레아티닌 기반 eGFR**은 보충제 영향으로 낮게 보일 수 있습니다. • 필요 시 의료진 판단으로 **시스타틴 C(크레아티닌 영향을 덜 받는 콩팥 기능 검사)**, 소변검사, 재검 시점 조정 등을 고려합니다. • 목표는 "검사 수치를 숨기는 것"이 아니라 **실제 신장 기능을 정확히 보는 것**입니다.

ONE LINE SUMMARY

건강한 성인이라면 크레아틴 모노하이드레이트 3~5g/일이 표준입니다. 신장질환, 신장 위험 요인, 신독성 약물, 임신·수유·청소년은 "시작 전 상담"이 안전선입니다.

함께 보기 — 영양제 전반의 복용 원칙은 「영양제, 이것만 알고 드세요」 안내문을 보세요 (edu.gwanggyobarun.com)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

주요 참고: ISSN 2017 · AIS 2024 · Mayo Clinic 2026 · JISSN 2025 탈모 무작위 연구 · Front Nutr 2024 인지기능 고찰

제품 선택 시 단일 성분 크레아틴 모노하이드레이트, 정확한 g 단위 표기, 불필요한 복합 성분이 적은 제품을 우선 확인하세요.

Updated 2026-09