
위내시경 검사 준비 안내문

위내시경의 정확도와 안전은 금식이 결정합니다. 위에 음식이 남아 있으면 위벽이 가려지고, 음식물이 기도로 넘어갈(흡인) 위험도 있습니다. 피를 묽게 하는 약·GLP-1 계열 주사를 쓰는 분은 임의로 끊지 말고 예약 때 의료진과 상의하세요.

금식 시간표 — 가장 중요한 한 가지

언제	지킬 것
검사 12시간 전 (보통 전날 저녁 9시)	**음식 완전 중단** — 일반식·우유·요구르트·유제품·과일·견과류·껌·사탕 모두 금지. 저녁은 흰밥·죽·수프로 가볍게, 늦은 저녁·야식은 피합니다.
검사 8시간 전부터	우유·주스·커피·차·붉은·보라색 음료·탄산음료(사이다·콜라 포함) 금지. 맑은 물·보리차·투명한 이온음료만 소량.
검사 2시간 전 ~ 직전	**맑은 물도 중단** · 흡연·껌·사탕 금지, 침 삼키는 정도만. 혈압약 등 꼭 필요한 약은 **검사 4시간 전까지** 물 50mL 이하로.



피를 묽게 하는 약(항혈전제) — 스스로 끊지 마세요

검사 종류	원칙 (아스피린·클로피도그렐(플라빅스)·와파린·먹는 항응고제)
단순 관찰·조직검사	출혈 위험이 낮아 **대부분 약을 끊지 않고** 검사합니다.
용종 절제·치료 내시경	출혈 위험이 높아 약마다 쉬는 기간이 다르고 **의료진이 정해 드립니다** — 클로피도그렐 5–7일, 와파린 5일 전(피 응고 수치 INR 확인), 먹는 항응고제(DOAC: 엘리퀴스·자렐토 등)는 마지막 복용 후 48시간 넘게.
모든 경우	심장·뇌졸중 위험과 출혈 위험을 함께 봐야 하므로 **주치의와 상의한 뒤 결정**합니다. 예약 때 은행잎 등 영양제·한약까지 약 목록 전체를 가져오세요.

위고비·마운자로 등 GLP-1 계열 주사

위에서 음식이 내려가는 속도가 늦어져 **금식을 지켜도 음식이 남을 수 있습니다.** 예약 때 약 이름·용량·마지막 투약일을 알려 주시면 일정을 함께 정합니다.
자세히: **'위고비·마운자로 사용 환자 검사 전 안내'** edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/glp1ra-pre-procedure/

다른 약 · 도착

- **당뇨약·인슐린** — 예약 때 개별 지시 확인(스스로 중단 금지)
- **철분제·위 코팅제(개비스콘 등)** — 예약 때 중단 여부 확인(시야 방해)
- **30분 전 도착** · 신분증·약 목록 지참
- 수면내시경은 보호자 동반 · 24시간 운전·음주·중요한 결정·기계 조작 금지
- **비수면으로 받으시면** → '비수면 위내시경, 이렇게 하면 덜 힘듭니다' edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/egd-nonsedated-how-to/

이럴 땐 바로 연락하세요 ☎ 031-893-4560

검사 전 — 감기·기침·발열·새 증상(검사 연기 여부 결정), 음식·물을 실수로 먹었을 때(먹은 시간 알려 주세요). 검사 후 — 검은변·혈변·심한 복통·구토, 38°C 이상 발열·가슴 통증·호흡곤란. **피를 토하거나 검은변·혈변이 많이 나오거나 심한 복통·가슴 통증·호흡곤란이 있으면 시간과 관계없이 응급실로(119).**

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기내시경학회 · ASGE 2023 · 영국·유럽 소화기내시경학회 항혈전제 지침(BSG/ESGE 2021) · AGA/ASA 2024 (GLP-1 계열) · OCULUS 무작위 연구 2026

본 안내문은 일반 권고이며, 환자별 기저질환과 복용 약제에 따라 처방·일정이 달라질 수 있습니다. GLP-1 계열·항혈전제 사용 환자는 반드시 사전 상담 후 검사 일정을 확정합니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endoscopy/egd-prep/