기능성 소화불량

내시경은 괜찮은데 왜 더부룩할까? 위가 움직이고 느끼는 방식의 문제일 수 있습니다.

왜 내시경이 정상인데 더부룩할까요?

내시경에서 큰 이상이 보이지 않아도 증상은 실제로 생길 수 있습니다. 위가 음식을 받아들이고 내보내는 방식, 위의 감각, 뇌와 장의 상호작용 문제일 때가 많아 **병보다 기능 문제일 확률이 높습니다.** 흔히 있는 문제이며, '정상' 검사 결과가 증상이 없다는 뜻은 아닙니다. 위와 뇌 신호가 예민해진 상태입니다. 아래 두 가지는 치료 방향을 정할 때 구분해 볼 증상이니 **진료 때 자세히 말씀해 주세요.**

식후에 불편한 쪽	명치가 아픈 쪽
식후 **꽉 찬 느낌** · 조금만 먹어도 **배부른 느낌**	명치 **통증 · 쓰림**

다음 단계는 이렇게 정합니다

순서	하는 일
① 헬리코박터균 확인	아직 검사하지 않았다면 **헬리코박터균 검사를 먼저** 확인하고, 있으면 **제균 치료**를 합니다.
② 위장약 반응 보기	**약을 써 보며 증상 변화를 확인합니다.** 먹다 말다 하지 말고 처방대로 끝까지 복용한 뒤 진료 때 경과를 알려 주세요. 며칠 먹고 좋아졌다는 이유만으로 다른 병이 없다고 확정할 수는 없습니다.
③ 안 좋아지면	다른 약이나 검사를 다시 상의합니다(필요하면 초음파·CT). 위험 신호가 있으면 먼저 알려주세요.

지금 식사 · 생활습관



불편할 때는 부드러운 음식을 천천히, 조금씩

식사는 이렇게	습관은 이렇게
• 증상이 심한 동안에는 잡곡·생야채·샐러드·과일·밀가루처럼 **몸에 좋은 음식도 더부룩함을 키울 수 있으니** 잠시 줄여 보세요. • 불편할 때는 **죽·누룽지·쌀밥·감자·두부**로 위를 쉬게 하세요. • 불편한 음식은 사람마다 다르니, **드신 음식과 증상을 같이 기록**해 두면 도움이 됩니다. • 증상이 가라앉으면 식사 범위를 다시 넓혀 갑니다.	• 식후엔 가볍게 걷기 — **담즙 역류에도 도움** • 평소 마시던 **커피는 갑자기 끊지** 않습니다. • **편두통**이 위장 증상으로 먼저 오기도 합니다.

자주 나오는 오해	바로 알기
"양배추·채소는 위에 좋으니 많이 먹을수록 좋다"	건강식이라도 지금은 증상을 키울 수 있습니다.
"초음파로 췌장을 다 볼 수 있다"	초음파 한 번으로 췌장 문제를 모두 배제할 수 없습니다. 필요하면 CT를 봅니다.
"더부룩하면 내시경·초음파를 바로 다 해봐야 안심"	필요한 검사는 나이·위험 신호·증상 양상에 따라 다릅니다.

바로 응급실로	며칠 더 지켜보지 말고 진료받으세요
피를 토하거나 검은 변을 볼 때	삼키기 점점 어려워짐 · 반복되거나 계속되는 구토 · 원인 모를 체중 감소 · 덩어리가 만져짐 · 황달 · 치료해도 계속 나빠짐. **위암 가족력**, 최근 **진통소염제·항혈전제** 사용도 꼭 알려주세요. 국내 지침은 일정 연령 이상에서 새로 생긴 소화불량에는 내시경을 먼저 권합니다.

약을 끊으면 다시 불편해질 때 진료실 설명 슬라이드 edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/refractory-dyspepsia/
위에 좋다는 영양제가 궁금하면 edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/stomach-supplements-evidence/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기기능성질환·운동학회 기능성 소화불량 진료지침 (2020) · Rome IV 진단기준 (2016) · British Society of Gastroenterology guidelines on the management of functional dyspepsia (Gut, 2022)

본 자료는 일반 환자교육용입니다. 증상이 지속되거나 위 위험 신호가 있으면 지체 말고 진료받으세요.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/functional-dyspepsia/