통풍 — 꼭 알아야 할 것만

통풍은 혈액 속 **요산**이 많아져 관절 안에 **결정**으로 쌓이면서 생깁니다. 그래서 치료도 두 갈래입니다 — **지금의 통증을 가라앉히는 약**과, **쌓인 요산을 녹여내는 약**. 이 두 가지를 구분해서 아시면 통풍 치료의 절반은 이해하신 것입니다.

지금 발작이 왔다면 — 먼저 이 네 가지



관절은 쉬게 하고, 냉찜질

1. **빨리 알려주세요.** 발작이 시작되면 되도록 빨리 병원에 알리고 진료를 받습니다.
2. **관절을 쉬게 하세요.** 다치지 않게 쓰지 말고, **냉찜질**을 합니다.
3. **핫팩·온찜질은 하지 마세요.** 혈관이 넓어져 염증이 오히려 심해집니다.
4. **먹던 요산 생성 억제제는 끊지 마세요.** 그대로 드시면서 통증 약을 함께 씁니다.

아플 때 잰 요산 수치는 낮게 나올 수 있습니다. 그 수치 하나만으로 통풍이 아니라고 단정할 수 없어, 통증이 완전히 가라앉은 뒤에 다시 검사해 정확한 값을 확인합니다.

약이 두 종류인 이유 — 불끄기 약과 청소 약

비교	불끄기 약 (급성기 치료)	청소 약 (요산 생성 억제제)
무엇을 하나	지금의 **통증과 염증**을 가라앉힙니다	관절에 쌓인 **요산 결정을 서서히 녹여냅니다**
어떤 약	콜히친 · 소염진통제 · 스테로이드	알로푸리놀 · 페북소스타트 등
언제 먹나	발작이 왔을 때 **짧게** — 발작이 가라앉으면 중단	매일 꾸준히 — **고혈압 약처럼 오래**. 목표에 도달해도 대개 계속 (결정이 천천히 녹기 때문)

청소 약을 드실 때 — 목표 수치와 검사 간격

혈중 요산 목표
<6 mg/dL

통풍결절이 있으면
<5 mg/dL · 더 낮게 잡기도 합니다

약을 시작하거나 올리는 동안
2~5주 간격으로 검사

목표에 도달해 안정되면
6개월 간격으로 검사

증상만 보지 않고 **수치를 확인하며** 약을 조절하고, 콩팥·간 기능도 함께 봅니다.

청소 약을 시작한 **초기에는 발작이 오히려 늘 수 있습니다.** 약이 안 맞아서가 아니며, 그래서 **발작을 막는 약을 최소 3~6개월 함께** 드십니다.

알로푸리놀을 시작하기 전 유전자검사(HLA-B*58:01)를 권합니다. 약을 드시다 **발진이 생기면 바로 알려 주세요.**

이런 신호가 오면 바로 오세요 — 참지 마시고 연락

드시는 약	이런 신호가 오면
요산 생성 억제제 알로푸리놀·페북소스타트	**원인 모를 열 · 피부 발진(특히 번지거나 물집) · 입안이 헐음 · 눈 충혈 · 얼굴 부종** → 즉시 중단하고 오세요
콜히친	멈추지 않는 **심한 설사**, 쥐어짜는 듯한 복통, 근육 통증
소염진통제	**검은 타르변 · 피를 토함**(위장 출혈 — 어지럼이 없어도 즉시 응급실), **소변량이 크게 줄거나 몸이 붓는 경우**(콩팥)
스테로이드	혈당이 평소보다 높아짐, 잠이 안 오거나 기분 변화, 감염 징후
약과 상관없이	**열이 나면서 여러 관절이 아프고 몸이 몹시 처질 때** — 감염 여부를 가려야 하므로 바로 오세요

무엇을 먹고, 무엇을 줄일까

드셔도 됩니다	양을 조절하세요	줄이는 것이 좋습니다
콩 · 두부 · 버섯 · 시금치 — 식물성 퓨린은 발작을 늘리지 않습니다	**붉은 고기**는 살코기 위주로 적정량 나눠서	**술** — 맥주가 가장 위험하지만 **소주도 요산을 올립니다**
저지방 우유 · 요구르트	**내장류 · 진한 곰탕 국물**은 피하세요	**콜라 · 주스 · 에너지드링크** 같은 단 음료
커피, 그리고 충분한 **수분**	**해산물**은 적당한 양으로. **등푸른생선**은 심장에 좋으니 유지	**굶는 다이어트 · 극단적 저탄고지**는 발작을 부릅니다 — 체중은 천천히

※ **체리·비타민C 보충제로 통풍을 치료할 수는 없습니다.** 음식 조절만으로 낮출 수 있는 요산에도 한계가 있어, 처방받은 약과 함께 가야 합니다.

약 고르는 기준(콩팥·심장 상황별)은 진료실 설명 자료 — 통풍: edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/gout/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 미국류마티스학회(ACR) 통풍 관리 지침 2020(FitzGerald et al., Arthritis Care Res 2020) · 유럽류마티스학회(EULAR) 통풍 권고 2016(Richette et al., Ann Rheum Dis 2017)

본 자료는 위 지침에 기반한 일반 교육 자료이며, 특정 약이나 제품을 권유·광고하지 않습니다. 실제 약 선택·용량·검사 주기는 콩팥·간 기능, 함께 드시는 약, 기저질환에 따라 달라지므로 반드시 진료 상담 후 결정합니다.

모바일로 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/gout-core/