고혈압 환자를 위한 저염식 가이드

저염식 (Low-Sodium Diet) — 하루 나트륨 2,000mg 이하로 줄이면 수축기 혈압을 평균 5~10mmHg 낮출 수 있습니다. 핵심 수치와 실천법을 한 장으로 정리했습니다.

한눈에 보는 핵심 수치

한국인 평균 섭취	권장 목표	소금 환산	기대 효과
3,136	**2,000**	**5**	**−5~10**
mg / 일 (목표의 1.6배)	mg / 일 (세계보건기구)	g / 일 (1작은술)	mmHg (수축기 혈압)

나트륨 줄이기는 소금통보다 영양표시, 국물, 혈압 변화를 함께 보는 습관입니다.

싱겁게 먹는 한 끼



국물은 적게 · 레몬·식초·허브로 맛내기

복약 중인 분 · IMPORTANT

이뇨제(다이크로짇·라식스 등) 또는 안지오텐신 계열 혈압약(ARB·ACE 억제제)을 드시는 중에 갑자기 나트륨을 크게 줄이면 기립성 저혈압·어지러움·전해질 불균형이 생길 수 있습니다. **1~2주에 걸쳐 조금씩** 줄이고, 어지러움이 이어지면 바로 외래로 연락주세요. (☏ 031-893-4560)

실천 항목 (Do & Don't)

이렇게 하세요 · DO	이것은 피하세요 · DON'T
1. 신선한 채소·과일 매끼 ½접시 이상 (나트륨 50mg 미만)	1. 국물 다 먹기 — 라면 국물 1대접 ≈ 1,800mg
2. 직접 조리할 때 소금 계량 — 1작은술(5g) 이내	2. 젓갈·장아찌 1큰술 ≈ 1,200mg (하루 목표의 60%)
3. 레몬즙·식초·허브·후추로 맛내기 (대체 양념)	3. 가공육 — 햄·소시지 100g ≈ 900mg
4. 칼륨 많은 식품 — 바나나·감자·시금치·고구마 (나트륨 배출 ↑) · **콩팥병이 있거나 안지오텐신 계열 혈압약·칼륨 보존 이뇨제를 드시면 먼저 상의**	4. 외식 소스·드레싱 듬뿍 (간장 1큰술 ≈ 1,000mg)
5. 영양성분표 확인 — 1회분당 나트륨 400mg 이하 선택	5. 인스턴트·배달 — 짜장면 1그릇 ≈ 2,400mg
6. 흰살생선·두부·계란으로 단백질 (나트륨 100mg 미만)	6. 통조림·즉석국 자주 사용 (1,000mg 이상)
7. 물 하루 1.5L 이상 — 나트륨 배출 촉진 (수분 제한 중이면 그 지시대로)	7. 단무지·피클 등 절임류 무제한 섭취

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 세계보건기구 나트륨 섭취 지침 (하루 2,000mg 미만) · 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 2022 (소금 하루 6g 미만) · 국민건강영양조사 2023 (평균 3,136mg)

함께 보기 — 가정혈압 재는 법 「혈압, 이렇게 재야 정확합니다」
edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/home-bp-measurement/

본 자료는 일반적 권고이며, 환자별 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 다음 장에 자주 먹는 식품의 나트륨 함량과 1주 감량 플랜이 이어집니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/hypertension-low-salt/

자주 먹는 식품의 나트륨 함량과 실천 플랜

한국인이 자주 먹는 음식의 1회분 나트륨 함량과 라벨 읽는 법, 1주일에 걸쳐 조금씩 줄이는 방법입니다.

자주 먹는 식품의 나트륨 함량 (1회분 기준)

식품	나트륨 (mg)	1회분량	하루 목표 대비
라면 (국물 포함)	**1,800**	1봉 (120g)	**90%**
짜장면 · 짬뽕	**2,400**	1그릇	**120%**
된장찌개	**2,000**	1뚝배기	**100%**
김치	**300**	50g (5쪽)	**15%**
햄 · 소시지	**900**	100g	**45%**
젓갈 · 장아찌	**1,200**	1큰술 (15g)	**60%**
간장	**1,000**	1큰술 (15ml)	**50%**

가공식품 라벨 읽기 · 7가지 체크

1. "1회 제공량" 먼저 확인 (전체 용량과 다름)
2. 1회분당 나트륨 mg 확인
3. "%영양성분 기준치" — 20% 이상은 높음
4. 저나트륨 표시 = 식품 100g당 나트륨 120mg 미만
5. "나트륨 무첨가" ≠ 0mg (원래 들어 있는 양은 있음)
6. 같은 종류는 나트륨 낮은 제품을 골라 비교
7. 1회분 × 먹은 횟수로 실제 섭취량 계산

언제	1주일 점진 감량 플랜
1–2일째	국물 양 ½로 줄이기 시작
3–4일째	라면·인스턴트 1회 → 0회
5일째	외식 1끼를 집밥으로
6일째	식초·레몬·허브 양념 시도
7일째	가공식품 라벨 직접 확인
2주차~	국물 ⅓만 마시기 정착
4주차	가정혈압 측정 → 외래 점검

저염 하루 식단 예시 (총 약 1,800mg)

아침

나트륨 약 400mg — 현미밥 1공기 · 두부조림(소금 계량) · 시금치나물 · 사과 ½개 · 보리차 — 두부 데치면 나트륨 50mg 미만

점심

나트륨 약 700mg — 잡곡밥 · 닭가슴살 샐러드(레몬 드레싱) · 미역국 ⅓공기 · 구운 고구마 — 외식 시 "싱겁게, 국물 따로"

저녁

나트륨 약 700mg — 현미밥 · 흰살생선구이(허브) · 김치 50g · 나물 무침 · 바나나 1개 — 김치 50g ≈ 나트륨 300mg

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

근거 — 세계보건기구 나트륨 섭취 지침 · 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 2022 · 식품의약품안전처 영양성분 데이터베이스

나트륨 함량은 일반적 평균치이며 제품·조리법에 따라 차이가 있습니다. 환자별 식이 처방은 담당 의사·영양사와 상담하시기 바랍니다.