잠이 안 올 때 — 수면제보다 먼저 할 것

생활 습관 개선은 기본이며, 오래가는 불면증의 우선 치료는 불면증 인지행동치료입니다. 먼저 바꿀 습관을 정리했습니다.

낮 동안 만드는 밤의 잠 — 이 네 가지부터

잠드는 시간보다	일어나면	카페인은	잠들기
기상 시각	**햇빛 + 걷기**	**낮 12시**	**3시간 전**
매일 같은 시각에 고정하기	아침 햇빛을 보고 낮에 걷기	까지만, 그 뒤로는 끊기	부터 휴대폰·TV 멀리하기

그래도 잠이 안 온다면



누워도 잠이 안 올 때 · 15분 규칙

- **15분** 넘게 잠이 오지 않으면 침대에서 나오세요
- **노란 불** 아래서 **재미없는 책**을 보며 시간을 보내세요
- 졸릴 때 다시 침대로 돌아가세요 — 침대는 잠자는 용도로만
- 시계는 자꾸 보지 마세요. 계속 확인하면 오히려 더 깨게 됩니다

멜라토닌 · MELATONIN

- 잠들기 **1~2시간 전**에 복용합니다
- 수면제보다 **중독과 내성 위험이 적습니다**
- 복용 시점·용량은 처방받은 제품 설명을 따르세요
- 모든 불면증에 같은 효과를 내지는 않습니다

수면제(졸피뎀 등)는 이렇게

향정신성의약품 · 원칙 세 가지

- **가끔, 짧게** — 필요한 기간만, 처방받은 용법 그대로 복용합니다
- **가족의 처방약도 나눠 먹지 마세요** — 법으로 금지돼 있고, 반응은 사람마다 다릅니다
- **깊은 잠을 보장하지는 않습니다** — 약마다 효과와 부작용이 달라 처방받은 대로만 드세요
- 오래 드셨다면 임의로 끊지 말고 **의사와 상의**해 줄이세요

흔한 오해 바로잡기

흔한 오해	의학적 사실 (바로 알기)
"누워 있으면 언젠가 잠든다"	깨어서 오래 누워 있으면 침대가 **뒤척이며 애쓰는 공간**이 됩니다. 졸릴 때 눕는 것이 원칙입니다.
"가족 수면제를 잘라 먹어도 된다"	향정신성의약품이라 **타인에게 건네는 것 자체가 불법**이고, 부작용도 사람마다 다릅니다.
"술 한잔 하면 잘 잔다"	잠드는 느낌은 들어도 **밤 후반에 자주 깹니다**. 수면제와 함께 마시는 것은 특히 위험합니다.

⚠ 이럴 땐 바로 진료를 · WARNING

수면제 복용 뒤 **기억나지 않는 행동**(몽유·야간 식사·운전)이 있었다면 약을 더 드시지 말고 즉시 진료받으세요. **심하게 휘청이거나 넘어졌다면** 다음 복용 여부를 스스로 정하지 말고 의료진에게 바로 연락해 지시를 받으세요(오래 드신 약은 갑자기 끊는 것도 위험합니다). **심한 코골이·목격된 무호흡·낮졸림**이 있으면 단순 불면이 아닐 수 있습니다. 잠이 거의 없는데 **기분이 들뜨거나 충동적**으로 변했거나 **자해·자살 생각**이 든다면 즉시 의료진에게 알려 주세요. 실행할 생각이나 충동이 있거나 스스로 안전을 지키기 어렵다면 혼자 있지 말고 119에 연락하거나 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 국내 불면증 임상진료지침 (2020) · European Insomnia Guideline (Journal of Sleep Research, 2023)

본 자료는 일반적인 안내이며, 오래된 불면증에는 인지행동치료 등 전문적인 치료가 도움이 될 수 있습니다. 복용법과 치료 계획은 담당 의사와 상의하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/insomnia-before-pills/