알러지 비염 코 스프레이, 이렇게 사용하세요

Intranasal Spray Technique — 같은 약이라도 자세와 각도에 따라 효과가 달라집니다. 코 점막에 약이 잘 닿게 하는 4단계 자세, 그리고 효과를 유지하려면 매일 꾸준히 사용해야 하는 이유.

STEP 1 · 턱을 살짝 당기세요 — 들지 마세요 (Head Position)



왼쪽 ✕ 약이 목으로 / 오른쪽 ✓ 약이 코 점막에

	✕ 턱 들기	✓ 턱 살짝 당기기
고개	뒤로 젖힘	정면 또는 **살짝 숙임**
스프레이 병	눕게 되어 **제대로 분사되지 않음**	똑바로 서서 고르게 분사
약이 가는 곳	코 점막을 지나 **목으로 흘러내림**	코 안쪽 점막에 **정확히 닿음**

STEP 2~4 · 분사 각도 → 살짝 흡입 → 매일 꾸준히 (Technique & Routine)

STEP 2 · 같은 쪽 눈 방향으로




팁을 콧구멍에 넣은 뒤, **왼쪽 콧구멍은 왼쪽 눈 쪽으로, 오른쪽 콧구멍은 오른쪽 눈 쪽으로** 살짝 틀어서 분무하세요. 콧등 가운데(비중격)를 향하면 **코피**가 납니다.

STEP 3 · 분사 후 살짝 흡입



뿌린 직후 **입은 다물고 코로 부드럽게 들이마십니다.** 너무 세게 빨면 약이 목으로 넘어갑니다. **분사 후 1~2분**은 코를 풀지 마세요.

STEP 4 · 매일 같은 시간에



효과는 먼저 시작될 수 있지만, **충분히 좋아지는 데 며칠~수 주** 걸릴 수 있습니다. 그때그때 쓰는 약이 **아니라** 매일 1~2회 꾸준히 써야 효과가 유지됩니다. **좋아져도 임의 중단 금지.**

뿌리기 전 준비 · 알아두세요 (Before & FAQ)

뿌리기 전에 · PREPARATION

코를 풀어 콧물·점액 먼저 빼냄. **식염수 세척** 후 사용하면 약 흡수가 더 잘됩니다

새 약이거나 **오래 안 쓴 약**은 **제품 설명서에 적힌 횟수**만큼 허공에 분사(prime)해 안개가 나오는지 확인

분사구는 **사용 후 마른 휴지로** 닦고, **정기 세척은 제품 설명서대로**

이럴 땐	이렇게 하세요
코피가 날 때	각도 재확인. **반복되면 진료.** 코의 부드러운 부분을 **10~15분 눌러도 안 멎거나** 출혈이 많고 어지러우면 **응급실로**
오래 써도 되나요	**전신 흡수가 적어** 장기 사용 가능(수치는 **제품마다 다름**). **임신·수유** 중이면 미리 상담
코막힘 즉효 스프레이(오트리빈 같은 혈관수축제)	다른 약입니다 — 오래 쓰면 **더 막히는 리바운드**, 짧게만 사용

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: ARIA 2024 (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) · KAAACI 2022 알레르기비염 진료지침 · AAO-HNS 2023 Clinical Practice Guideline (Allergic Rhinitis Update) · ARIA–EAACI 비강 치료 지침 2024–2025(혈관수축제 리바운드). 본 자료는 일반 안내이며 개인의 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/nasal-spray-allergic-rhinitis/