금연 — 챔픽스 복용법과 습관 관리

금연은 니코틴 중독과 행동(습관) 중독, 두 가지를 함께 다루는 과정입니다. 챔픽스(바레니클린)는 정해진 순서대로 증량하며, 84일을 다 채운 사람이 다시 피우는 비율이 낮습니다.

TITRATION SCHEDULE

정해진 순서대로 늘려 가세요

84 일 (표준 치료기간)

식후 바로 드시면 메스꺼움이 줄어듭니다. 물과 함께 복용하세요.

기간	용량	함께 할 일
1~3일째	**0.5mg 하루 1회**	식후 물과 함께 시작합니다
4~7일째	**0.5mg 하루 2회**	하루 2회로 늘립니다
8일째부터	**1mg 하루 2회**	이 무렵 금연일을 정합니다



복용 중 알아두기 (Daily Notes)

TAKE WITH

식후 · 물

메스꺼움 완화

SLEEP ISSUE

악몽·불면

저녁 약 시간 조정은 진료 시 상의

RESTART RULE

0.5mg부터

장기간 중단 후 재도전 시 처음 용량으로

FULL COURSE

84일

12주 완주가 원칙

중독의 두 축 (Two Sides of Addiction)

니코틴 중독 · 챔픽스가 돕는 부분

1. 갈망·금단 증상 완화 — 담배 생각과 니코틴 금단 증상을 줄여 줍니다.
2. 흡연 만족감 차단 — 중간에 한 대를 피워도 예전만큼 만족스럽지 않게 합니다.
3. 보통 12주(84일) 치료 — 용량과 기간은 효과·부작용에 따라 담당 의사가 조정합니다.

행동(습관) 중독 · 스스로 관리할 부분

1. 계기 상황 미리 알아두기 — 식후·커피·스트레스처럼 담배가 떠오르는 순간을 파악합니다.
2. 술자리가 가장 큰 고비 — 미리 대처 계획을 세워 두세요.
3. 한 번 피웠다고 포기하지 마세요 — 복용을 멈추지 말고 계속 이어가세요.

바로 연락·응급실이 필요한 경우 (Call Clinic / ER)

이런 증상이 생기면	이렇게 하세요
자살 생각, 갑작스럽고 심한 기분·행동 변화	즉시 복용을 멈추고 연락하세요. 실행할 생각이나 충동이 있으면 **119에 연락하거나 응급실**로 가세요.
얼굴·입술·혀·목 부종, 호흡곤란	응급 상황이니 바로 **응급실로 가거나 119**에 연락하세요.
입안 등 점막 병변을 동반한 발진	즉시 복용을 멈추고 **응급실**로 가세요.
경련(발작)	즉시 복용을 멈추고 **응급실**로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거: 국가암정보센터 「금연 약물요법」(2023) · WHO Clinical Treatment Guideline for Tobacco Cessation in Adults (2024) · Cochrane Database Syst Rev 2016(PMID 27158893) · Lancet 2016 EAGLES(PMID 27116918) · Nicotine Tob Res 2019(PMID 29986105). 본 자료는 일반 복약 안내이며 개인 증상과 재시작 시점은 담당 의사의 판단을 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/smoking-cessation-varenicline/