갑상선 호르몬제 복용법

씬지로이드, 씬지록신 등 레보티록신은 "얼마나 먹는가"만큼 "언제, 무엇과 떨어뜨려 먹는가"가 중요합니다. 기본 원칙은 아침 공복, 물만, 1시간 금식 유지입니다.

가장 중요한 원칙



약 먼저, 식사·커피는 1시간 뒤

반드시 공복에 따로 복용하세요

1시간 이상

약을 삼킨 뒤에도 물 외에는 드시지 말고, 아침식사·커피·우유·영양제는 뒤로 미뤄 주세요. 갑상선 호르몬은 공복 복용, 커피·영양제 간격, 일정한 시간이 핵심입니다.

한눈에 보는 복용 순서와 간격

때	할 일	주의
① 기상 직후 아침 공복	**물 한 컵과 함께 1회 복용**합니다.	물만 허용. 다른 약은 같이 삼키지 않습니다.
② 7~8시 전후	아침 시간대가 몸의 갑상선 호르몬 리듬과 가장 잘 맞습니다.	매일 같은 시간에 드세요.
③ 복용 1시간 뒤	**식사·커피 시작.** 가능하면 매일 같은 간격을 유지합니다.	그 전에는 식사·커피·우유 금지
혈액검사 날	**약 복용 전**에 채혈합니다.	가능하면 오전, 매번 같은 조건

함께 먹으면 흡수를 방해하는 것과 간격

무엇	간격	이렇게 하세요
커피·주스·우유·두유·아침식사	**복용 후 1시간**	**물로만 삼키기** — 커피, 주스, 우유, 두유와 함께 복용하지 않습니다.
철분제·칼슘제·마그네슘·종합비타민	**최소 4시간**	최소 4시간 분리합니다.
제산제·위장약·콜레스테롤 약 중 담즙산 결합제(콜레스티라민)·위 점막 보호제(수크랄페이트)	**의사와 확인**	새 약 시작 전 함께 복용 가능 여부를 확인하세요.

이렇게 드세요 vs 피하세요

권장 행동

1. 매일 같은 시간 — 특히 갑상선암 수술 후 TSH(갑상선 자극 호르몬) 목표가 있는 분은 더 중요합니다.

2. 아침식사는 1시간 뒤 — 바쁘면 약부터 먹고 씻기·준비 시간을 활용하세요.

피하세요

1. 식사 직후·커피 직후 복용 금지 — 흡수가 줄어 TSH가 흔들릴 수 있습니다.

2. 용량 임의 변경 금지 — 변경 후 보통 6~8주 뒤 혈액검사로 조정합니다.

3. 증상은 참고만 — 부족(피로·변비)·과함(두근거림·불면)이 있어도 스스로 용량을 바꾸지 마세요.

왜 아침 공복을 기본으로 권하나요?

몸의 리듬과 일관성

갑상선 호르몬은 하루 리듬이 있어 TSH는 밤에, T4·T3(갑상선 호르몬)는 아침에 피크로 보고됩니다(제한된 자료).

아침 7~8시 복용은 공복 간격을 지키기 쉽고 흡수 저하도 줄입니다.

TSH만 살짝 높다면 2~3개월 뒤 재검사부터 합니다.

저녁 복용은 언제 대안인가

저녁(마지막) 식사 후 3시간 이상 지나 취침 전 복용하는 것도 대안입니다.

연구 결과는 엇갈립니다. 야식·영양제가 잦다면 아침 공복이 안전합니다.

진료실 설명 자료 — **갑상선 기능저하증**: edu.gwanggyobarun.com/decks/endocrine/hypothyroidism/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — ATA Hypothyroidism Guideline 2014 · AACE Patient Journey · Bach-Huynh et al., JCEM 2009 · Bolk et al., Arch Intern Med 2010 · Endocrine Reviews 2025 · 유럽갑상선학회(ETA) 레보티록신 지침 2025 · 대한갑상선학회 무증상 갑상선기능저하증 권고안 2023 · AACE·ATA 성인 갑상선기능저하증 지침 2012

본 자료는 일반 복약 안내이며 개인 처방은 담당 의사의 지시를 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/thyroid-hormone-taking/