

# 20대 남성 다한증 원인부터 치료 순서까지

손·발·겨드랑이 땀이 생활을 방해할 때, 원발성 여부를 확인하고 단계적으로 치료합니다

# 20대 초반이면 먼저 원발성 국소 다한증을 봅니다

특정 부위·양측성·수면 중 호전이면 전신질환보다 체질성 땀 분비 조절 문제가 흔합니다

# 0.99

주요 기준 4개 충족 시 원발성 가능성

## TYPICAL

사춘기-20대 초반 시작, 손·발·겨드랑이 중심, 양쪽이 비슷하고 긴장·더위에 악화됩니다.

## CHECK FIRST

전신으로 땀이 나거나 밤에 흠뻑 젖는 경우, 체중감소·열·두근거림이 있으면 다른 원인부터 확인합니다.

## GOAL

완전 무한증보다 “일상 방해 감소”가 현실적인 목표입니다. HDSS 1-2점 개선을 추적합니다.

# 진단은 "6개월 + 생활 방해 + 국소 패턴"입니다

검사보다 문진과 부위 확인이 먼저이며, 원발성 기준을 빠짐없이 확인합니다

## CRITERIA · 01

### 6개월 지속

뚜렷한 원인 없이 반복되는 국소 땀이 6개월 이상 이어졌는지 확인합니다.

## CRITERIA · 02

### 양측·대칭

한쪽만 심하면 신경학적·피부 국소 원인 감별이 필요합니다.

## CRITERIA · 03


### 일상 방해·주 1회 이상

약수, 필기, 운동, 대인관계, 옷 젖음 등 기능 손상을 묻습니다.

## CRITERIA · 04

### 25세 전 시작·수면 중 호전

가족력도 함께 확인합니다. 자는 동안 계속 젖으면 전신 원인을 봅니다.



# 부위별로 치료가 달라집니다

손·발·겨드랑이·얼굴/두피를 나누어 기록하면 치료 선택과 의뢰 시점이 명확해집니다

## PALM

### 손바닥

약수·필기·휴대폰 터치 불편. 군 병역 기록에서는 손바닥 땀 양상이 특히 중요합니다.

## SOLE

### 발바닥

양말 젖음, 냄새, 피부 짓무름. 손과 함께 이온영동을 고려하기 쉽습니다.

## AXILLA

### 겨드랑이

옷 젖음·냄새 걱정. 외용제, 국소 항콜린제, 보툴리눔 독소 선택지가 많습니다.

## FACE

### 얼굴·두피

사회적 긴장과 연결되기 쉽습니다. 약물 부작용과 원인 질환 감별이 더 중요합니다.

## TRIGGER

### 악화 요인

더위, 운동, 발표, 카페인, 매운 음식, 스트레스와의 연결을 기록합니다.

## QUALITY OF LIFE

### 생활 영향

피부 증상만이 아니라 회피 행동, 자신감 저하, 불안·우울 동반 여부를 함께 봅니다.

# HDSS로 중증도와 치료 반응을 숫자로 봅니다

“불편하다”를 1-4단계로 기록하면 치료 실패와 다음 단계가 분명해집니다

1

**거의 불편하지 않음**

일상 활동에 지장 없음

2

**참을 만한 불편**

가끔 일상 활동에 방해

3

**참기 어려운 불편**

자주 일상 활동에 방해, 치료 강화 고려

4

**견디기 어려운 불편**

항상 일상 활동에 방해, 전문치료 의뢰 고려

RESPONSE

**1점 ↓**

땀 분비 약 50% 감소로 해석

STRONG RESPONSE

**2점 ↓**

땀 분비 약 80% 감소 수준

RECORD

**3개월**

군 병역·시술 의뢰에는 진료 기록과 치료 경과가 중요

# 겨드랑이는 외용제부터 정확히 써 봅니다

효과가 없던 경우도 사용 시간·피부 상태·자극 관리가 맞지 않아서 실패한 일이 많습니다

## STEP 01

### 알루미늄클로라이드

10~20% 제품을 마른 피부에 취침 전 바르고 6~8시간 뒤 씻어냅니다.

## STEP 02

### 국소 항콜린제

겨드랑이용 소프피로니움 5% 겔 등 처방 선택지를 고려합니다.

## HOW

### 마른 피부·밤 사용

면도 직후, 상처, 젖은 피부에는 자극이 늘 수 있어 피합니다.

## SAFETY

### 눈·입 접촉 주의

손을 씻고, 흐릿함·입마름·소변 불편 같은 항콜린 부작용을 확인합니다.

## FOLLOW-UP

### 4주 뒤 HDSS 재평가

1개월 사용에도 HDSS가 전혀 내려가지 않으면 다음 단계로 넘어갑니다.

## TIP

### 자극이 치료 실패는 아님

빈도 조절, 보습, 제형 변경으로 조절되면 같은 단계에서 계속할 수 있습니다.



# 손·발은 이온영동이 현실적인 다음 단계입니다

시술보다 먼저 반복 치료와 유지 계획을 세우면 보상성 다한증 걱정 없이 접근할 수 있습니다

## INDUCTION

### 초기 2-4주

주 2-4회, 20-30분씩 반복합니다. 효과가 생기면 간격을 늘려 유지합니다.

## MAINTENANCE

### 유지 치료

개인별 재발 간격에 맞춰 주 1회 또는 격주로 조절합니다.

## CAUTION

### 금기 확인

심박동기, 부정맥, 금속 삽입물, 임신 가능성이 있으면 먼저 상담합니다.

## NEXT

### 실패 시 보툴리눔 독소

손바닥은 통증 조절·일시적 손 힘 약화 가능성을 설명하고 결정합니다.



# 먹는 항콜린제는 “상황 선택형”으로 씁니다

20대 활동량이 많은 남성은 운동·더위·운전·소변 증상을 함께 고려해야 합니다

## 도움이 되는 경우

시험·면접·발표처럼 예측 가능한 짧은 상황에서 단기 사용을 검토합니다.

여러 부위가 함께 불편하고 외용제·이온영동만으로 부족할 때 고려합니다.

최저 용량부터 입마름, 변비, 졸림, 시야 흐림을 보며 조절합니다.

옥시부티닌·글리코피롤레이트 등은 치료 효과가 있어도 부작용 때문에 지속이 어려울 수 있습니다.

## 주의가 큰 경우

더운 환경·격한 운동에서는 땀 억제로 열 관련 질환 위험이 올라갈 수 있습니다.

흐린 시야·운전문제가 생기면 복용 타이밍과 용량을 즉시 조정합니다.

소변이 잘 안 나옴, 변비 악화, 심한 입마름은 중단·상담 신호입니다.

다른 항콜린성 약을 이미 복용 중이면 전체 항콜린 부담을 함께 계산합니다.



# 시술은 부위와 기대기간을 나누어 선택합니다

외용제·이온영동 후에도 HDSS 3-4가 지속될 때 피부과·흉부외과 의뢰를 검토합니다

## BOTULINUM TOXIN

겨드랑이 근거가 강함

수개월 효과를 기대합니다. 손바닥은 통증·일시적 손 힘 약화 설명이 필요합니다.

## MAPPING

땀나는 면적 표시

요오드-전분 검사 등으로 부위를 확인하고 격자 형태로 나누어 시술합니다.

## MIRADRY

겨드랑이 전용 선택지

비급여·부기·감각 이상 가능성, 장기 효과와 비용을 함께 비교합니다.

## EXPECTATION

완치보다 조절

재시술 가능성, 효과 지속 기간, 보험·비용을 치료 전 확인합니다.



# 전신 땀은 감별 먼저, ETS는 마지막 선택입니다

원인 질환이 숨어 있거나 수술 뒤 보상성 다한증이 생기면 되돌리기 어렵습니다

## RED FLAG

### 전신·야간·새로 시작

성인 이후 갑작스런 시작, 밤에 흠뻑 젖음, 비대칭·한쪽만 심한 경우는 감별이 우선입니다.

## WORKUP

### 증상 기반 검사

체중감소·열·림프절, 갑상샘 증상, 두통+고혈압 발작이 있으면 표적 검사를 합니다.

## ETS

### 회복 어려운 수술

보상성 다한증이 흔하고 심할 수 있어, 중증 손 다한증에서 최후 수단으로만 논의합니다.

## NOT FIRST

### 겨드랑이 단독에는 신중

외용제·국소 항콜린제·보툴리눔 독소·miraDry를 먼저 비교합니다.



# 진료 후 4주 실천 체크리스트

기록이 쌓이면 치료 효과, 병역 서류, 전문의 의뢰 판단이 모두 쉬워집니다

## 01 HDSS를 부위별로 적기

손·발·겨드랑이를 나누어 1-4점으로 기록합니다.

## 02 땀 일지 4주 유지

시간, 상황, 젖은 옷·종이·악수 불편을 짧게 메모합니다.

## 03 외용제는 마른 피부에

취침 전 사용, 다음 날 세척, 자극 시 빈도 조절을 상담합니다.

## 04 더위·운동 약물 주의

먹는 약 복용 중 과열, 흐린 시야, 소변 불편을 확인합니다.

## 05 손·발은 이온영동 문의

기기 금기와 초기 치료 일정, 유지 간격을 함께 정합니다.

## 06 병역 기록은 미리

수장부 다한증은 진료·치료 기록이 등급 판단에 중요합니다.

## 07 불안·우울도 같이 말하기

회피 행동, 발표 공포, 자신감 저하는 치료 목표에 포함됩니다.

## 08 위험 신호는 바로 진료

야간 발한, 체중감소, 열, 두근거림, 발작적 두통+고혈압은 감별이 필요합니다.

# 다한증은 참는 병이 아니라 기록하고 조절하는 병입니다

부위별 HDSS와 치료 반응을 함께 보며 가장 부담이 적은 단계부터 시작합니다

## CLINIC

광교바른내과

## PHONE

031-893-4560

## ADDRESS

경기도 용인시 수지구  
광교중앙로 298, 4층 402-404호

## HOURS

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00)  
토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

## CARE

소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진



☎ ) □ 0 ± Ý @ V vó

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요