알레르기 검사(MAST) 결과 안내

MAST는 여러 알레르기 유발물질에 몸이 예민한지(항체가 있는지)를 한 번에 보는 **선별검사**입니다. 양성이 나와도 곧 "알레르기 환자"라는 뜻은 아니며, 실제 증상과 생활을 함께 보고 판단합니다.

감작이란



감작 — 몸이 특정 물질(꽃가루·집먼지진드기·동물 비듬 등)에 **IgE 항체**를 만들어 예민해진 상태입니다.

검사 '양성'은 바로 이렇게 **예민해진 상태(감작)**를 뜻합니다.

먼저 꼭 알아두세요

양성의 의미	CLASS 숫자	무증상 양성	해석 원칙
감작	**예민도**	**흔함**	**증상+**
예민해진 상태일 뿐, 진단 아님	증상 심각도와는 별개	정상인 약 8~30%도 양성	병력·생활과 함께 판단

결과 등급(Class) 읽는 법

등급	참고 수치(kU/L)	무슨 뜻인가요	감작 강도
Class 0	< 0.35	이 물질엔 예민하지 않아요(음성).	없음
Class 1	0.35–0.70	아주 약하게 예민해진 상태예요(경계).	약함
Class 2	0.70–3.5	예민해진 상태예요. 증상 있을 때만 의미.	낮음
Class 3	3.5–17.5	비교적 뚜렷하게 예민해진 상태. 증상과 함께 봐요.	중등도
Class 4	17.5–50	강하게 예민해진 상태예요. 다만 증상 심함과는 별개.	높음
Class 5	50–100	매우 강하게 예민해진 상태예요. 노출 관리가 중요.	매우 높음
Class 6	> 100	가장 강한 단계. 실제 반응은 사람마다 달라요.	최고

참고 수치는 대표 기준(ImmunoCAP·PROTIA)이며 **브랜드마다 등급 경계가 다를 수 있어** 다른 병원 결과지의 숫자와 직접 비교하지 마세요. 등급은 '얼마나 예민한가'이지 '얼마나 아픈가'가 아닙니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한천식알레르기학회(KAAACI) · EAACI · AAAAI · WAO IgE 진단 position paper

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 진단과 치료는 증상·병력·생활과 재검 결과를 함께 보고 담당 의사가 결정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/allergy-mast/

자주 묻는 질문 · 다음 단계

검사 결과는 '참고 자료'입니다. 실제 증상과 함께 보고, 필요하면 추가 검사나 전문 진료로 확인합니다.

총 IgE(전체 알레르기 항체)도 함께 봅니다

총 IgE	무슨 뜻인가요
100 이상	알레르기 항체가 많은 상태로, 개별 항목과 증상을 함께 보고 원인을 찾습니다.
100 미만	총 IgE가 낮아도 특정 물질에 대한 알레르기가 없다고 단정할 수는 없어, 개별 항목 결과와 증상을 함께 봅니다.

검사의 한계 (약 120종)

세상의 **모든** 알레르기 물질을 다 검사할 수는 없습니다.

총 IgE는 높은데 검사 항목이 모두 음성이면, 목록에 없는 다른 물질이 원인일 수 있어 추가 평가가 필요합니다.

자주 묻는 질문

결과 숫자에 대해

Q. 수치가 높으면 더 심한가요?

아니요. 높은 등급은 항체가 많다는 뜻이지, 증상이 심하다는 뜻이 아닙니다.

Q. 증상이 없는데 왜 양성인가요?

항체만 있고 증상 없는 '감작'은 정상인의 8~30%에서도 흔합니다. 실제 노출 때 증상이 있어야 알레르기입니다.

앞으로에 대해

Q. 몇 년 뒤 바뀌나요?

감작은 나이·노출에 따라 변할 수 있습니다(특히 소아 음식 알레르기). 필요 시 다시 평가합니다.

Q. 평생 못 먹나요?

검사 양성 하나로 평생 제한을 정하지 않습니다. 반응 병력이 없으면 무조건 끊을 필요는 없고, 필요 시 정밀검사로 확인합니다.

결과를 받은 뒤, 다음 단계

증상이 있는 항목이라면	확인이 더 필요하면
회피·환경관리 — 의심되는 물질 노출을 줄입니다(집먼지진드기 침구 관리 등).	**정밀검사** — 정확한 수치가 필요하면 ImmunoCAP·성분분자진단으로 확인합니다.
약물 상담 — 증상에 맞춰 항히스타민·비강 스프레이 등을 진료 후 사용합니다.	**총 IgE 높은데 다 음성** — 목록에 없는 원인을 찾기 위해 추가 평가를 합니다.
반복·심한 증상 — 면역치료 등 근본 치료는 알레르기 전문 진료로 상담합니다.	**정기 재평가** — 감작은 시간에 따라 변할 수 있어 필요 시 다시 검사합니다.

⚠ 이럴 땐 꼭 진료와 상담하세요

결과와 실제 증상이 서로 맞지 않거나, 정확한 수치가 필요할 때(면역치료·식이 제한 결정 등)는 정밀검사(ImmunoCAP·성분분자진단)나 알레르기 전문 진료로 확인합니다. 특히 **두드러기·입술·눈 부종, 숨참, 실신 등 심한 알레르기 반응(아나필락시스)**을 겪은 적이 있으면 반드시 알려주세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한천식알레르기학회(KAAACI) · EAACI · AAAAI · WAO IgE 진단 position paper

본 자료는 공통 설명용입니다. 실제 진단과 치료는 증상·병력·생활과 재검 결과를 함께 보고 담당 의사가 결정합니다.