변비약, 이렇게 쓰세요

어떤 약을 언제 먹고, 언제 쉬는지 집에서 보는 약 사용 안내입니다. 자극성 하제는 필요할 때만 짧게, 삼투성 하제는 편하게 쓰세요.

변비약은 종류마다 쓰는 법이 다릅니다



물을 붙잡는 약 · 가끔만 쓰는 자극하는 약

한 줄 요약

삼투성 하제(마그밀·락툴로스)는 필요할 때 편하게, **자극성 하제**(둘코락스·메이킨 등)는 며칠씩 안 나올 때 짧게 쓰는 **'구조용'**입니다.

변비약을 먹다 **설사가 나면 변비약부터 쉬고**, 콩팥이 약한 고령자는 **관장·마그네슘 제제를 조심**하세요.

생활습관(물이 부족했다면 채우기·매일 걷기·키위·푸룬·차전자피)은 진료실 **「변비 설명 자료」**에 자세히 있습니다 — edu.gwanggyobarun.com/decks/gi/chronic-constipation/

삼투성 하제 vs 자극성 하제

구분	삼투성 하제 · 마그밀·락툴로스	자극성 하제 · 둘코락스·메이킨 등
어떻게 듣나	장 안에 **수분을 머물게 해** 배변을 돕습니다.	장을 **직접 자극**해 배변을 유도합니다.
언제 · 얼마나	의존이 적어 **필요할 때 편하게** 쓸 수 있습니다.	**며칠씩 안 나올 때만** 짧게 쓰는 구조용 약입니다(보통 4주 이내). **매일 습관처럼 먹지 마세요** — 매일 필요하다면 진료실에서 약을 다시 정합니다.
주의	락툴로스는 **가스·복부팽만**이 흔하고, 마그밀은 **콩팥 기능**을 확인해야 합니다.	사용 계획은 진료실에서 확인하세요.

이런 상황엔 이렇게 하세요

상황	이렇게 하세요
변비약 먹다 설사가 나면	**설사약을 더하지 말고 변비약부터 쉬세요.** 추가 복용을 멈추고 지켜보고, 설사가 계속되거나 심하면 진료를 받으세요.
콩팥이 약한 고령자	관장, 특히 **인산염 관장**을 조심하세요. **마그네슘 제제**(마그밀 등)도 주의가 필요합니다. 콩팥 기능이 걱정되면 진료 시 미리 말씀해 주세요.
"센 변비약이 좋은 약"?	빠르게 듣는 약이 모두에게 맞는 것은 아닙니다. 내 상태에 맞는 약을 고르는 것이 우선입니다.
"약 먹을 때만 나오니 계속 먹어야 한다"?	약이 필요할 만큼 변비가 지속되고 있다는 뜻일 수 있습니다. 생활습관을 함께 조절하며 약을 다시 평가하세요.

바로 진료가 필요한 경우

다음 중 하나라도 있으면 바로 진료를 받으세요 — **소량의 혈변**, 원인 모를 **체중 감소나 빈혈**, 배·항문에서 만져지는 **덩이**, 마그네슘 제제 복용 중 **무기력·졸림·어지럼**. ☎ 031-893-4560

피가 많이 나오거나 검고 끈적한 변(타르변), 심한 복통·구토와 가스·변이 전혀 안 나옴, 맥박이 느려지거나 의식이 흐려지면 응급실로 가세요.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기기능성질환·운동학회 2022 서울 합의 지침 · AGA-ACG 2023 Chronic Idiopathic Constipation Guideline(PMID 37211380) · Management of Constipation in Older Adults, Am Fam Physician 2015(PMID 26371734) · Comparative Effectiveness of Kiwifruit, Psyllium, or Prunes, Am J Gastroenterol 2021(PMID 34074830)

본 자료는 일반 안내이며 환자 상태에 따라 처방의 판단이 우선합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/laxative-guide/