프리베나20 vs 캡박시브, 어떤 차이가 있을까요?

성인 폐렴구균 백신 상담용 — 두 백신이 막는 균 종류, 근거, 한국 권고, 비용을 한눈에 정리합니다

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

‘무조건 더 좋은 백신’은 아직 없습니다

두 백신 모두 성인에서 한 번 맞으면 끝나는 최신 단백결합백신입니다

01

둘 다 1회로 끝

성인은 보통 0.5 mL를 팔 근육에 **한 번** 맞으면 접종이 끝납니다.

1회 접종

02

프리베나20(PCV20)의 강점

아이부터 어른까지 넓은 나이에 허가됐고, 오래 써 온 경험이 쌓여 있습니다.

넓은 나이 · 긴 경험

03

캡박시브(PCV21)의 강점

성인에게 남아 있는 중증(침습성) 감염 균 종류에 더 맞춰 설계했습니다.

성인형 균 종류

Tip · 차이는 ‘몇 가지냐’보다 **어떤 균 종류를 겨냥했느냐**에 있습니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항 · 미국 질병통제예방센터(CDC) · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

두 백신은 겨냥한 균 종류가 다릅니다

프리베나20은 넓게 늘린 범용형, 캡박시브는 성인 중증 감염 균 종류 중심입니다

	프리베나20 (PCV20)	캡박시브 (PCV21)
설계	PCV13을 넓힌 20가지 백신	성인에게 남은 중증 감염 균 종류에 맞춘 21가지 백신
허가 나이	소아부터 성인까지 넓게	한국 허가는 **18세 이상 성인**만
대표 균 종류	4·6B·19F 등 이 백신에만 있는 균 종류	23A·23B·24F·31·35B 등 성인형 균 종류
강점	한국 소아 국가예방접종 편입 · 긴 사용 경험	미국 감시 자료 기준 성인 균 종류 범위가 더 넓음
한계	성인형 새 균 종류는 적게 포함	실제 폐렴 예방효과 우월은 **직접 입증되지 않음**

Tip · 한국에서는 아이들이 PCV20을 맞기 시작해 가족 단위로 설명하기 쉽습니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항 · STRIDE-3 연구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실에서 확인할 네 가지

허가 나이, 한국 출시, 소아 사용, 면역증강제 여부를 구분합니다

성인 용량 — 둘 다 0.5 mL 1회

성인 접종은 팔 근육에 1회 맞으면 끝나는 것이 기본입니다.

PCV20 — 20가지 · 소아와 성인

한국 허가는 생후 6주부터 성인까지이며, 소아 국가예방접종에 들어갔습니다.

PCV21 — 21가지 · 한국은 성인용

한국 허가는 18세 이상 성인만입니다. 미국은 2026년 2~17세 고위험군 보충 접종도 허가했습니다.

성분 — 둘 다 단백결합백신

두 백신 모두 운반 단백질(CRM197)을 붙였습니다. PCV20은 알루미늄 보조제가 있고, PCV21은 면역증강제가 없습니다.

Tip · 두 백신은 같은 날 함께 맞는 것이 아니라 **둘 중 하나**를 고르는 것입니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항 · 미국 DailyMed 허가문서

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른 내과

겹치는 균 종류와 다른 균 종류

어떤 균 종류가 들어 있는지가 백신 선택의 핵심입니다

구분	균 종류(혈청형)
프리베나20에만 9가지	1 · 4 · 5 · 6B · 9V · 14 · 18C · 19F · 23F 4번은 PCV21에 없지만 한국에서는 비율이 낮은 편입니다.
둘 다 포함 10가지	3 · 6A · 7F · 8 · 10A · 11A · 12F · 19A · 22F · 33F
15B	두 백신 모두 15B 유래 항원을 포함합니다. 캡박시브에는 변형된 15B 항원이 들어 있으며, 15B 침습성 감염 예방도 허가됐습니다.
캡박시브에만 11가지	9N · 15A · 15C · 16F · 17F · 20A · 23A · 23B · 24F · 31 · 35B 이 중 8가지는 기존 백신에 없던 새 균 종류입니다.




그림 · 두 백신이 막는 균 종류는 가운데가 겹치고, 양쪽 끝은 서로 다릅니다(설명용 그림).

Tip · 한국 성인 중증 감염에서 중요한 3번과 19A번은 두 백신 모두에 있습니다.

근거 · STRIDE-3 균 종류 구성 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

직접 비교는 '면역반응' 비교입니다

실제 폐렴·중증 감염 예방효과가 더 낫다고 직접 비교해 증명한 연구는 아직 없습니다

약 2,600

명이 참여한 직접 비교

접종한 적 없는 성인의 항체 반응 비교

10/10

공통 균 종류 — 뒤지지 않음

겹치는 10가지 모두 PCV20에 뒤지지 않음

10/11

PCV21 고유 — 더 높음

10가지는 더 높았고 15C는 비슷했습니다

PCV20의 근거

PCV13·PPSV23과 면역반응을 비교한 자료와 기존 단백결합백신 경험을 바탕으로 허가됐습니다.

중요한 한계

'항체 반응이 더 높다'가 '폐렴을 더 잘 막는다'는 뜻은 아닙니다. 두 백신 모두 실제 예방 효과는 장기 사용 자료가 더 필요합니다.

Tip · 항체 반응은 혈액 검사로 잰 '면역이 생긴 정도'입니다.

근거 · STRIDE-3, Lancet Infectious Diseases 2024 · FDA 시판 후 연구 요구

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

한국 권고에서 두 백신은 동등합니다

접종 대상·순차 접종 일정은 폐렴구균 백신 설명자료에서 다룹니다 — 여기서는 고를 때 필요한 것만

선택지	내용
PCV21 · PCV20 1회	대한감염학회 2026 개정 — 65세 이상과 19~64세 고위험군에서 동등한 선택지(PCV15 뒤 PPSV23도 동등)
국가 무료 접종	65세 이상 무료는 **다당백신(PPSV23) 1회** — PCV20·PCV21은 대개 본인 부담
우리 진료	미국은 50세 이상 모두에게 권하지만, 국내 권고와 위험도를 함께 보고 정합니다

Tip · 본인 부담 백신은 병원마다 가격이 다를 수 있습니다 — 접종 전에 확인하세요.

근거 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 미국 CDC·ACIP 성인 권고 2025

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

어떤 경우에 어느 쪽을 더 생각할까요?

어느 쪽이 더 낫다는 판정이 아니라, 나에게 맞는 선택을 돕는 설명입니다

PCV20을 더 고려

넓은 적응증과 오랜 사용 경험을 중시할 때

- 아이부터 어른까지 이어지는 적응증을 선호할 때
- 4·19F 등 PCV20에만 있는 균 종류를 중요하게 볼 때
- PCV13 기반 자료와 긴 시판 경험을 중시할 때
- 가족 단위 접종·소아 국가예방접종과 연결할 때
- 가격·구하기가 더 유리할 때

vs

PCV21을 더 고려

성인 중증 감염 균 종류를 가장 중시할 때

- 성인에게 남은 균 종류를 넓게 막고 싶을 때
- 23A·23B·24F·31·35B 등 성인형 균 종류를 염두에 둘 때
- 만성질환·면역저하 등 고위험 성인일 때
- 미국 성인 감시 자료의 범위 차이를 반영하고 싶을 때
- 단, 실제 효과가 더 낫다고 단정하지는 않습니다

Tip · 어느 백신이든 **맞는 것**이 맞지 않는 것보다 훨씬 중요합니다.

근거 · 미국 CDC 균 종류 범위 분석 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

진료실에서는 이 순서로 정합니다

이미 PCV20이나 PCV21을 맞았다면 보통 추가 접종은 권하지 않습니다

1 기존 접종 확인 기록

PPSV23·PCV13·PCV20·PCV21 중 무엇을 언제 맞았는지 봅니다.

2 나이·위험도 확인 대상

65세 이상인지, 19~64세 고위험군인지, 면역저하가 있는지 봅니다.

3 비용 상담 무료·본인 부담

무료 PPSV23과 본인 부담 PCV20·PCV21의 차이를 설명합니다.

4 함께 선택 결정

균 종류, 사용 경험, 가격, 본인 선호를 함께 보고 정합니다.




그림 · 접종 기록과 선택지를 함께 보며 상담합니다(설명용 그림).

Tip · 예방접종도우미(nip.kdca.go.kr)에서 내 접종 기록을 미리 확인해 오세요.

근거 · 미국 CDC 폐렴구균 접종 안내 · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

접종 뒤에는 대부분 1~3일 안에 좋아집니다

통증·피로·두통·근육통은 흔하지만, 오래가거나 심하면 확인이 필요합니다



그림 · 접종 뒤에는 편히 쉬고 물을 충분히 마십니다(설명용 그림).

주사 부위 통증 — 가장 흔함

냉찜질과 휴식, 필요하면 해열진통제로 조절합니다.

피로 · 두통 · 근육통

대부분 1~3일 안에 좋아집니다. 심한 운동은 하루 쉽니다.

부작용 차이는 단정하지 않음

직접 비교에서 큰 문제는 없었지만, 드문 부작용을 가리기엔 참가자가 적었습니다.

심한 알레르기 반응은 119

숨이 차거나 온몸 두드러기·얼굴과 목 부기·심한 어지럼이 있으면 **즉시 119에 연락해 응급실로** 가세요.

Tip · 1~3일이 지나도 나아지지 않으면 병원에 알려 주세요.

근거 · 미국 식품의약국(FDA)·식품의약품안전처 허가사항 · STRIDE-3 안전성 자료 · 미국 CDC 백신 안전 안내

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

접종 기록을 가져오시면 함께 정합니다

두 백신 모두 좋은 선택지입니다 — 접종 기록·질환·비용·선호를 함께 보고 결정합니다

광교바른내과

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

이 자료의 성격

PCV20과 PCV21 중에서 고를 때 쓰는 상담 자료입니다. 접종 기록을 가져오시면 함께 비교해 드리고, 접종 방법·간격·비용은 폐렴구균 예방접종 안내문을 드립니다.

참고한 자료

미국 FDA·식품의약품안전처 허가사항 · STRIDE-3(Lancet Infectious Diseases 2024) · 대한감염학회 성인 예방접종 권고 2026 · 미국 CDC·ACIP 2025

SCAN TO REVISIT

집에서 다시 보기

QR을 스캔하면 핸드폰에서
같은 자료를 다시 볼 수 있어요