
# 성인 수두, 일찍 진료받고 전파를 줄이세요

수두(Varicella)는 수두·대상포진바이러스(VZV)에 처음 감염되어 생깁니다. 성인은 합병증이 더 흔해 초기 진료가 중요합니다.

## 발진은 여러 단계가 함께 보입니다




구진에서 수포·농포·딱지로 진행하지만, 한 부위에 여러 단계의 발진이 동시에 보입니다.

## 수두와 대상포진은 다릅니다

| 살필 내용 | 내용과 행동 |
|---|---|
| **수두** | 처음 감염된 뒤 약 2주 잠복기를 거쳐 발진이 나타납니다. 얼굴·두피에서 시작해 몸통·팔다리로 퍼집니다. |
| **발진 특징** | 구진은 12시간 이내 수포로 빠르게 변하고, 한 부위에 구진·수포·농포·딱지가 함께 보입니다. |
| **대상포진** | 잠복해 있던 바이러스가 다시 활성화된 것입니다. 대체로 한쪽에 띠 모양 수포가 군집해 나타납니다. |

## 발진 전부터 전염될 수 있습니다

성인은 발열·두통·허리 통증이 발진보다 2~3일 먼저 나타날 수 있습니다. 전염성이 있는 기간은 발진 1~2일 전부터 모든 병변에 딱지가 생길 때까지입니다. 이 기간에는 다른 사람에게 전파되지 않도록 접촉을 피하세요.

**광교바른내과 · 031-893-4560**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진
아산 28회 연수강좌 — 피부 발진으로 보는 내과 질환(정준민)

*개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.*

# 성인 수두, 일찍 진료받고 전파를 줄이세요

성인 수두는 합병증과 면역 상태를 살피며 치료를 정합니다. 약은 진료 후 처방에 따라 사용하세요.

## 성인 수두는 치료를 일찍 시작합니다

| 살필 내용 | 내용과 행동 |
|---|---|
| **경구 치료** | 강의에서는 발진 24시간 이내 아시클로버(acyclovir) 800mg, 1일 4회, 7일 경구 치료를 소개했습니다. 실제 처방은 진료에서 정합니다. |
| **면역저하·중증** | 아시클로버 10mg/kg을 8시간마다 정맥 투여하는 치료를 설명했습니다. 수두폐렴 등 중증 환자가 해당합니다. |
| **다른 항바이러스제** | 연자 Q&A: 팜시클로비르도 VZV에 활성이 있지만 국내 허가사항에서 수두가 별도 적응증으로 명시되지 않았으며, 성인 수두의 직접 임상시험 근거는 아시클로버가 더 확립되어 있다고 답했습니다. |

## 폐렴·뇌염·이차 감염에 주의합니다

성인 수두의 합병증으로 수두폐렴, 피부의 이차 세균감염, 드물게 뇌염이 소개됐습니다. 강의에서 제시한 10~30% 사망률은 수두폐렴에 대한 수치입니다. 성인 수두 전체의 사망률을 뜻하지 않습니다.

## 진료 전에 정리할 내용

1. 발진이 처음 생긴 날짜와 발열·두통·허리 통증이 시작된 때를 알려주세요.
2. 면역저하 상태인지, 발진이 어떻게 퍼지고 있는지 알려주세요. 발진이 생기면 치료 시기를 놓치지 않도록 빨리 진료받으세요.

**광교바른내과 · 031-893-4560**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 피부 발진으로 보는 내과 질환(정준민)

*개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.*

집에서 다시 보기