성장기 운동선수의 요통

척추분리증(spondylolysis)의 협부 결손과 자연 경과

> 성장기·운동선수의 요통에서 협부(pars interarticularis) 결손을 생각한다. 반복적인 신전·회전은 피로골절(stress fracture)과 연결된다.

핵심 판단의 흐름



누구에게 생기는가

항목	교재·강의 내용
정의·위험 양상	Pars interarticularis defect. 체조처럼 신전과 회전을 반복하는 운동선수에서 더 흔하다.
성별	남자가 여자보다 2–3배 흔하다.
연령별 빈도	출생 시 0%, 5–7세 5%, 18세 6–7%로 제시했다. 성장기에 발생할 수 있다.

영상과 경과를 연결한다

항목	강의의 진료 포인트
단순 X-ray	협부가 끊어진 소견으로 진단할 수 있어 개원가에서 진단 후 의뢰하는 경우가 있다.
통증 경과	결손이 그대로 남아도 통증이 저절로 좋아질 수 있다.
전방전위증	교재는 진행 43–74%, 대개 경도 전위(Gr 1–2)로 제시한다. 경우에 따라 수술이 동반된다.

진료실에서 기억할 점

협부 결손 자체와 전방전위증으로의 진행을 구분해 설명한다. 운동 양상·성장기 여부·X-ray 소견을 정리해 전문 진료로 연결한다.