MASLD 섬유화 평가·간 전문의 의뢰 카드

지방증 영상 확인을 기다리지 않고, 위험군에서 FIB-4부터 단계적으로 평가합니다.

FIB-4 → 탄성도 검사 → 의뢰

2형 당뇨 / 비만 + 대사위험인자 ≥1개 / 지속 간효소 상승

FIB-4 <1.3
진행성 섬유화 저위험
FIB-4를 1–3년마다 재평가

FIB-4 1.3–2.67
VCTE 또는 대체검사
<8.0 kPa: 동반질환 적극 관리
≥8.0 kPa: 간 전문의 의뢰

FIB-4 >2.67
간 전문의 의뢰
간질환 진단·관리계획
동반질환 집중 관리

교재 알고리즘: ≤65세 기준. >65세에서는 낮은 절단값을 2.0으로 적용합니다.

계산에 필요한 네 값

FIB-4 구성	임상 적용
나이 · AST · 혈소판수 · ALT	일차 선별검사로 사용. 1.3 미만에서 높은 음성예측도를 활용해 진행성 섬유화 배제에 접근.
1.3–2.67의 중간 범위	VCTE 시행 또는 동반질환 집중 관리 후 1년 재평가. 이후 <1.3이면 1–3년 추적; ≥1.3이면 VCTE(교재의 두 선택경로).

탄성도 검사 해석

검사	강의·교재 제시
Fibroscan(VCTE)	간경변 AUROC 0.87–0.98; 유의한 섬유화 0.75–0.93. 복수·비만에서 측정 불가 또는 정확도 저하. XL probe(2.5 MHz)는 M probe보다 낮은 값.
MRE	진행성 섬유화 AUC 0.90(95% CI 0.84–0.94). 비용·검사시간 고려. 단계별 제시 절단값: F1 3.45 / F2 3.66 / F3 4.11 / F4 4.71 kPa.

일차진료 연결 · 연자 Q&A 의견

1·2차 의료기관에서는 FIB-4 계산과 Fibroscan 등 단계적 접근으로 3차 의료기관 의뢰를 권고했습니다. 당뇨 환자의 중등도·고위험 결과를 놓치지 않습니다.

광교바른내과 · 의료진 진료 참고
아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/asan28-masld-fibrosis-referral/