구충제, 정기적으로 먹어야 하나요?

날음식과 기생충 예방 — 요즘 한국에서 흔한 기생충은 흙이 아니라 **음식**으로 옵니다. 그래서 구충제를 정기적으로 먹기보다 **잘 익혀 먹는 것**이 더 중요합니다.

정기적으로 구충제를 먹어야 할까요

연수강좌 질의응답 · 연자의 답변

"요즘도 예방을 위해 구충제를 먹어야 하나요?"라는 질문에 연자는 이렇게 답했습니다. 예전에 주기적으로 복용하던 구충제는 **알벤다졸**이고, 회충 같은 **장내 기생충에 효과가 있는 약**입니다. 그러나 현재 한국에서 흔한 기생충은 장내 기생충보다 **음식을 통해 전파되는 간흡충·폐흡충·조충류**여서 **주기적으로 구충제를 복용할 필요는 없을 것 같고**, 지금은 기생충 예방을 위해 **음식을 잘 익혀 먹는 것이 가장 중요하다**고 답했습니다.

⊕ 익혀 먹기

예방의 **가장 중요한 방법**입니다.

⊖ 정기 구충제

알벤다졸은 **장내 기생충**에 듣는 약으로, 정기 복용은 필요 없을 것 같다고 했습니다.

걱정되면 진료

약은 **종류에 맞게** 진료실에서 정합니다.

어떤 날음식에서 어떤 기생충이 올까요



연어·송어회	육회(덜 익힌 고기)	민물고기 날것	민물게장	생미나리
광절열두조충	무구조충	간흡충	폐흡충	간질

치료약은 진료실에서 처방합니다. **광절열두조충·무구조충·간흡충·폐흡충**은 프라지콴텔이고, **간질**은 알벤다졸·프라지콴텔이 듣지 않아 트리클라벤다졸을 씁니다.

생선·고기 — 연자가 설명한 내용

연어·송어회

- 큰 생선이 작은 물고기·플랑크톤을 먹으며 몸에 감염형이 쌓여, **야생 송어·연어**가 문제입니다.
- 사료를 먹여 키운 **국내 양식 송어**가 원인이 될 확률은 매우 낮다고 했습니다.
- 대변에 납작하고 길쭉한 조각이 나올 수 있습니다.

육회·돼지고기

- 지금은 돼지고기가 아니라 **육회**를 먹어 걸리는 무구조충이 주로 문제가 됩니다.
- 유구조충은 예전 제주 돼지에서 알려졌고 지금은 **한국에서 거의 없어졌습니다.**
- 유구조충의 충란을 잘못 삼키면 신경계에 낭미충이 생겨 **치명적일 수 있어** 조심합니다.

민물고기 (간흡충)

- 조사하면 **한국에 남은 가장 흔한 기생충**입니다. 몇 cm의 작은 민물고기를 날로 무쳐 먹은 분이 주로 걸렸고, 지금은 주로 **4대강 유역**에 남아 있습니다.
- 담도(쓸개즙길)에 살며 **증상이 거의 없고 조용합니다.** 만성 염증이 오래되면 담도암이 문제가 됩니다.

게장·미나리, 그리고 흙에서 오는 기생충

게장과 미나리

간장게장이 다 위험할까요?

꽃게	깊은 바다(수심 20~30m)에 삽니다. 시판 **간장·양념게장 대부분이 꽃게**여서 걸릴 확률이 높지 않습니다.
민물참게	폐흡충의 **전통적인 위험 요인**이지만 지금은 4대강 유역의 아주 제한된 지역에서만 잡힙니다.
돌게	갯벌에 사는 게로, 꽃게보다는 폐흡충 감염 위험이 있을 수 있다고 연자는 설명했습니다.

폐흡충은 다슬기를 거쳐 **민물게·민물가재**에 있고, 메콩강에서 민물게를 잡아 먹은 분들에서 집단 발생한 사례도 있다고 했습니다.

미나리 (간질)

- 한국에서 간질 위험 음식은 **미나리를 생으로 먹는 것**이 가장 대표적입니다.
- 간질은 원래 소·양 같은 **초식동물의 기생충**이며, 사람이 수생식물을 잘못 먹으면 걸립니다.
- 미나리 자체의 감염률은 **1% 이하(0.4%, 2017년)**로 매우 낮지만 0은 아닙니다.
- 처음 간에 들어갈 때는 **열·오른쪽 윗배 통증**이 있을 수 있고, 성숙해 담도에 자리 잡으면 **황달·담관염**이 문제가 됩니다.

흙·환경에서 오는 기생충은 어떨까요

기생충	크기	어떻게 걸리나요	치료
회충	10cm 전후, 눈에 보임	환경에서 성숙한 충란을 **삼켜서**	알벤다졸 1회
구충	1cm 전후	**맨발**이 토양에 닿을 때 유충이 피부로	알벤다졸 1회
편충	3~5cm	환경의 성숙 충란을 삼켜서	알벤다졸 3일
요충	약 1cm	6시간이면 감염형 — **가족 모두**	반복 치료 (별도 안내문)

대변으로 나온 것이 **둥글고 길쭉하면** 대부분 회충이고 알벤다졸이 잘 듣습니다. **납작하고 길쭉하면** 조충이며 프라지콴텔로 치료합니다. 기생충을 먹어서 살을 뺀다는 이야기도 있지만, 성충을 먹으면 그냥 소화될 뿐이고 **감염은 날음식**으로 됩니다.

⚠ 이럴 때는 진료 때 꼭 말씀해 주세요

대변에 **기생충이 나왔을 때**(사진·동영상도 도움이 됩니다), 민물고기·민물게·미나리를 날로 드신 뒤 **열·오른쪽 윗배 통증·황달**이 있을 때. 4대강 주변에 사셨거나 민물고기를 날로 드신 이력도 알려 주세요.

? 연수강좌 질의응답 — 검진 CT 소견

증상 없이 찍은 복부 CT에서 간 안 담도 확장이 보여 간흡충이 의심된 경우, 연자는 개인적으로 **4대강 주변 거주·민물고기 생식 같은 노출 이력이 있으면 프라지콴텔을 3일간 복용**하도록 권한다고 답했습니다.

함께 보기 — 요충 가족 치료 안내: edu.gwanggyobarun.com/handouts/infectious/asl28-pinworm-family-care/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · ☏ 031-893-4560 · 평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

출처 · 아산 28회 연수강좌 — 진료실에서 경험할 수 있는 기생충 질환(김민재)

본 자료는 일반 안내입니다. 구충제의 종류와 복용 여부는 증상과 노출 이력을 보고 진료실에서 정합니다.

집에서 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/infectious/asl28-deworming-raw-food/