
경동맥 초음파에서 플라크가 보였다면

벽 두께, 플라크, 혈관이 좁아진 정도(협착률)는 서로 다른 소견입니다. 플라크가 보였다고 바로 시술이 필요한 것은 아니며, 대부분은 약물치료와 생활관리로 관리합니다.

검사 결과에서 보는 핵심



플라크가 쌓여 혈관 통로가 좁아진 모습

벽 두께	협착 정도
1mm↑	**70%↑**
동맥경화 시작 신호	스텐트·수술 고민

LDL 목표	생활관리
< 70	**금연**
플라크 있으면 강화(mg/dL)	약 빠짐없이 복용

스타틴과 LDL 목표

스타틴이 하는 일	LDL 목표와 복약
• 스타틴은 **진행을 늦추고 플라크를 안정시켜**, 터져서 혈전이 되는 위험을 낮춥니다. • **혈관은 젊을 때로 되돌릴 수 없습니다.**	• **의미 있게 좁아진 플라크면 LDL 목표가 70 아래로 내려갑니다.** 좁아진 정도와 전체 위험도를 보고 진료에서 정합니다. • 처방받은 **약을 빠지지 않고 먹고, 금연합니다.**

생활에서 지킬 것

꼭 할 것	피해야 할 것
• 처방받은 약을 **빠짐없이 복용**합니다. • **금연**합니다. • 진료실에서 정한 간격으로 **정기 추적검사**를 받습니다.	• **목 마사지나 경락**은 피합니다. • **혈액순환제라는 이름만으로 작용을 판단할 수 없습니다.** 복용 중인 제품을 알려주시고 처방약을 대신하지 마세요. • 임의로 약을 중단하거나 용량을 조절하지 않습니다.

흔한 오해 바로잡기

흔한 오해	의학적 사실 (바로 알기)
"혈액순환이 잘 되면 플라크가 떨어진다"	플라크는 없애는 대상이 아니라 **안정시키는** 대상입니다.
"경동맥이 괜찮으면 LDL이 높아도 된다"	검사 한 곳의 결과만으로 전체 혈관 위험을 판단할 수 없습니다.

즉시 응급실로 가야 하는 경우

갑자기 **한쪽 팔·다리에 힘이 빠지거나**, **말이 어눌해지거나**, **한쪽 눈이 갑자기 안 보이면** 증상이 금방 좋아지더라도 즉시 119를 부르거나 응급실로 가세요.

함께 보기 — 내 LDL 목표가 정해지는 방법: edu.gwanggyobarun.com/handouts/endocrine/ldl-target-by-risk/

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2022 한국 이상지질혈증 진료지침 제5판 · Carotid Arterial Plaque Ultrasound Consensus(J Am Soc Echocardiogr 2020) · Atherosclerotic Plaque Stabilization and Regression(Nat Rev Cardiol 2024)

본 자료는 일반적 안내이며 실제 협착 정도·위험인자에 따라 방침이 달라집니다. 시술·약물 결정은 담당 의사와 상담하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/carotid-plaque/