
# 백혈구 촉진 주사 뒤, 통증과 검사 변화

지속형 백혈구 촉진 주사(peg-G-CSF) 뒤에는 백혈구가 일시적으로 오르고 뼈가 아플 수 있습니다. 주사 이력과 함께 증상을 살펴야 합니다.

## 주사 뒤 몸에서 일어나는 변화




백혈구 촉진 주사 후 골수 증식으로 일시적 백혈구 증가와 뼈 통증이 나타날 수 있습니다.

## 예상되는 반응을 알아둡니다

| 살필 내용 | 내용과 행동 |
|---|---|
| **백혈구 증가** | 주사 후 수일 동안 백혈구(WBC)가 일시적으로 크게 오를 수 있습니다. 추적하면 회복되는 변화입니다. |
| **뼈 통증** | 골수에서 혈구가 늘면서 허리·골반·대퇴 부위가 아플 수 있습니다. 통증이 심한 경우도 있습니다. |
| **다른 검사** | ALP·LDH·요산 수치가 가볍게 오르기도 하며, 되돌아올 수 있는 변화로 설명했습니다. |

## 주사 이름과 날짜를 알려주세요

1. 항암치료 날짜와 백혈구 촉진 주사를 맞은 날짜를 기록하세요. 강의에서는 항암 다음 날 투여하는 예방 주사를 설명했습니다.
2. 뉴라스타·뉴라펙·롤론티스·듀라스틴·롱퀵스 등이 소개됐습니다. 다른 병원에서 검사할 때도 투여 이력을 알려주세요.

**광교바른내과 · 031-893-4560**

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호)

*개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.*

# 백혈구 촉진 주사 뒤, 통증과 검사 변화

주사 후 예상 반응과 함께, 감염이나 다른 문제를 의심할 증상을 구분해 살핍니다.

## 증상에 따라 다시 진료받습니다

| 살필 내용 | 내용과 행동 |
|---|---|
| **통증만 있을 때** | 진료에서 주사 시점을 살펴보고 아세트아미노펜·소염진통제(NSAIDs), 필요시 항히스타민제 등으로 통증을 조절합니다. |
| **열·오한·감염 징후** | 주사 반응으로만 넘기지 않고 감염과 호중구감소성 발열을 먼저 평가합니다. |
| **숨참·부종·저혈압** | 드문 모세혈관누출증후군 등을 고려해 의뢰하는 신호입니다. |
| **왼쪽 윗배 통증** | 드문 비장비대·파열 등을 고려해 의뢰하는 신호입니다. |

## 이런 경우에는 바로 진료

체온 ≥38.3°C 또는 ≥38.0°C가 1시간 이상 지속되면 응급실로 가세요. 새로 생긴 호흡곤란도 즉시 평가할 신호입니다. 백혈구가 높더라도 발열·오한·국소 감염 징후가 있으면 감염을 먼저 살핍니다.

## 높은 수치 하나로 백혈병을 단정하지 않습니다

강의 증례에서는 주사 후 백혈구 약 4만이 나와 백혈병을 걱정했지만, 실제로는 peg-G-CSF에 따른 증가였습니다. 반대로 매우 높은 수치나 증상을 동반한 지속 상승은 담당 병원에서 평가해야 합니다. 교재에서는 초고도 백혈구 증가의 예로 >100×10⁹/L를 제시하고, 증상을 동반하며 계속 오르는 경우도 의뢰 신호로 설명했습니다.

**광교바른내과 · 031-893-4560**
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호
평일 08:30~18:30 (점심 13:00~14:00) · 토 08:30~13:30 · 일·공휴일 휴진
소화기내과 · 일반내과 · 5대암 검진

아산 28회 연수강좌 — 암 환자가 우리 병원에 왔을 때: 개원의를 위한 증상 관리 가이드(정재호)

*개인의 상태와 치료에 따라 안내가 달라질 수 있습니다. 담당 의료진과 상의하세요.*

집에서 다시 보기