안약도 약 목록에 녹내장 약과 내과 부작용

심혈관·호흡기 증상, 졸림, 국소 불편감을 함께 확인

전신 증상과 국소 증상을 나눕니다

현재 쓰는 녹내장 약
점안제 · 복합제 · 경구제

전신 증상
β차단제: 심혈관·호흡기
α_2작용제: CNS 억제

눈 주변 증상
자극·충혈·눈물·건조
치료 지속 여부 확인

내과 문진 · 약 목록

- ☐ 안약 이름·사진, 성분/복합제, 횟수·시작/변경일: _____
- ☐ 부정맥·천식 등 심폐 병력, 졸림·다운되는 느낌: _____
- ☐ 충혈·자극·눈물·건조·두통과 투여의 시간 관계: _____

처방 안과와 교환할 내용

전달할 내용	기록
의심 약제·증상, 시작/변경 시점, 심폐 병력	_____
안과 협의 내용 · 약제 변경 · 시야검사 계획	_____

성분·경로별 한눈에 보기

계열	강의의 효과·사용 특성	점검할 부작용
β차단제	안압 **15~20% ↓**	심혈관·호흡기 영향. 부정맥·천식 병력
α_2작용제	안압 **15~20% ↓**	졸림·CNS 억제, 알레르기 **15~36%**. 교재는 **5세 미만 사용 금지** 표기
탄산탈수효소억제제 (CAI)	점안형 **15~20% ↓** 전신형과 구분	전신형: 감각이상·신독성·Stevens–Johnson 증후군 점안형: 각막 상피·내피 독성
Prostaglandin 유사체	**하루 1회**, 안압 **25~30% ↓**	충혈·색소침착·눈꺼풀 고랑 깊어짐·다모증. 경한 두통·피로 가능

성경림 연자 Q&A · 장기 사용과 약제 변경

자극감·충혈·눈물·건조증은 여러 점안제에서 생길 수 있고, 효과와 내약성이 맞는 약으로 정착하기까지 여러 번 변경할 수 있다고 설명했습니다. 시야검사는 중증도·진행 속도에 따라 **3개월~1년**, 급격히 악화하면 더 자주 시행한다고 답했습니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine
경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 4층 402-404호 · 031-893-4560

자료 다시 보기
QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/medication/glaucoma-eyedrops-medication-card/