# 고혈압 환자를 위한 저염식 가이드

저염식 (Low-Sodium Diet) — 하루 나트륨 2,000mg 이하로 줄이면 수축기 혈압을 평균 5~10mmHg 낮출 수 있습니다. 핵심 수치와 실천법을 한 장으로 정리했습니다.

## 한눈에 보는 핵심 수치

| 한국인 평균 섭취 | 권장 목표 | 소금 환산 | 기대 효과 |
|---|---|---|---|
| **3,136** | **2,000** | **5** | **−5~10** |
| mg / 일 (목표의 1.6배) | mg / 일 (세계보건기구) | g / 일 (1작은술) | mmHg (수축기 혈압) |

나트륨 줄이기는 소금통보다 영양표시, 국물, 혈압 변화를 함께 보는 습관입니다.

## 싱겁게 먹는 한 끼



국물은 적게 · 레몬·식초·허브로 맛내기

**복약 중인 분 · IMPORTANT**

이뇨제(다이크로짇·라식스 등) 또는 안지오텐신 계열 혈압약(ARB·ACE 억제제)을 드시는 중에 갑자기 나트륨을 크게 줄이면 기립성 저혈압·어지러움·전해질 불균형이 생길 수 있습니다. **1~2주에 걸쳐 조금씩** 줄이고, 어지러움이 이어지면 바로 외래로 연락주세요. (☏ 031-893-4560)

## 실천 항목 (Do & Don't)

| 이렇게 하세요 · DO | 이것은 피하세요 · DON'T |
|---|---|
| 1. 신선한 채소·과일 매끼 ½접시 이상 (나트륨 50mg 미만) | 1. 국물 다 먹기 — 라면 국물 1대접 ≈ 1,800mg |
| 2. 직접 조리할 때 소금 계량 — 1작은술(5g) 이내 | 2. 젓갈·장아찌 1큰술 ≈ 1,200mg (하루 목표의 60%) |
| 3. 레몬즙·식초·허브·후추로 맛내기 (대체 양념) | 3. 가공육 — 햄·소시지 100g ≈ 900mg |
| 4. 칼륨 많은 식품 — 바나나·감자·시금치·고구마 (나트륨 배출 ↑) · **콩팥병이 있거나 안지오텐신 계열 혈압약·칼륨 보존 이뇨제를 드시면 먼저 상의** | 4. 외식 소스·드레싱 듬뿍 (간장 1큰술 ≈ 1,000mg) |
| 5. 영양성분표 확인 — 1회분당 나트륨 400mg 이하 선택 | 5. 인스턴트·배달 — 짜장면 1그릇 ≈ 2,400mg |
| 6. 흰살생선·두부·계란으로 단백질 (나트륨 100mg 미만) | 6. 통조림·즉석국 자주 사용 (1,000mg 이상) |
| 7. 물 하루 1.5L 이상 — 나트륨 배출 촉진 (수분 제한 중이면 그 지시대로) | 7. 단무지·피클 등 절임류 무제한 섭취 |

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☏ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 세계보건기구 나트륨 섭취 지침 (하루 2,000mg 미만) · 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 2022 (소금 하루 6g 미만) · 국민건강영양조사 2023 (평균 3,136mg)

함께 보기 — 가정혈압 재는 법 「혈압, 이렇게 재야 정확합니다」
edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/home-bp-measurement/

*본 자료는 일반적 권고이며, 환자별 상황에 따라 달라질 수 있습니다. 다음 장에 자주 먹는 식품의 나트륨 함량과 1주 감량 플랜이 이어집니다.*

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/hypertension-low-salt/

# 자주 먹는 식품의 나트륨 함량과 실천 플랜

한국인이 자주 먹는 음식의 1회분 나트륨 함량과 라벨 읽는 법, 1주일에 걸쳐 조금씩 줄이는 방법입니다.

## 자주 먹는 식품의 나트륨 함량 (1회분 기준)

| 식품 | 나트륨 (mg) | 1회분량 | 하루 목표 대비 |
|---|---|---|---|
| 라면 (국물 포함) | **1,800** | 1봉 (120g) | **90%** |
| 짜장면 · 짬뽕 | **2,400** | 1그릇 | **120%** |
| 된장찌개 | **2,000** | 1뚝배기 | **100%** |
| 김치 | **300** | 50g (5쪽) | **15%** |
| 햄 · 소시지 | **900** | 100g | **45%** |
| 젓갈 · 장아찌 | **1,200** | 1큰술 (15g) | **60%** |
| 간장 | **1,000** | 1큰술 (15ml) | **50%** |

### 가공식품 라벨 읽기 · 7가지 체크

1. "1회 제공량" 먼저 확인 (전체 용량과 다름)
2. 1회분당 나트륨 mg 확인
3. "%영양성분 기준치" — 20% 이상은 높음
4. 저나트륨 표시 = 식품 100g당 나트륨 120mg 미만
5. "나트륨 무첨가" ≠ 0mg (원래 들어 있는 양은 있음)
6. 같은 종류는 나트륨 낮은 제품을 골라 비교
7. 1회분 × 먹은 횟수로 실제 섭취량 계산

| 언제 | 1주일 점진 감량 플랜 |
|---|---|
| **1–2일째** | 국물 양 ½로 줄이기 시작 |
| **3–4일째** | 라면·인스턴트 1회 → 0회 |
| **5일째** | 외식 1끼를 집밥으로 |
| **6일째** | 식초·레몬·허브 양념 시도 |
| **7일째** | 가공식품 라벨 직접 확인 |
| **2주차~** | 국물 ⅓만 마시기 정착 |
| **4주차** | 가정혈압 측정 → 외래 점검 |

## 저염 하루 식단 예시 (총 약 1,800mg)

**아침**

**나트륨 약 400mg** — 현미밥 1공기 · 두부조림(소금 계량) · 시금치나물 · 사과 ½개 · 보리차 — 두부 데치면 나트륨 50mg 미만

**점심**

**나트륨 약 700mg** — 잡곡밥 · 닭가슴살 샐러드(레몬 드레싱) · 미역국 ⅓공기 · 구운 고구마 — 외식 시 "싱겁게, 국물 따로"

**저녁**

**나트륨 약 700mg** — 현미밥 · 흰살생선구이(허브) · 김치 50g · 나물 무침 · 바나나 1개 — 김치 50g ≈ 나트륨 300mg

**광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine**

근거 — 세계보건기구 나트륨 섭취 지침 · 대한고혈압학회 고혈압 진료지침 2022 · 식품의약품안전처 영양성분 데이터베이스

*나트륨 함량은 일반적 평균치이며 제품·조리법에 따라 차이가 있습니다. 환자별 식이 처방은 담당 의사·영양사와 상담하시기 바랍니다.*