

# 천식 (Asthma), 올바른 이해와 관리로 건강한 호흡

기도 염증을 다스리는 단계별 치료, 흡입기 바르게 쓰는 법, 위험 신호까지

# 천식 치료, 세 가지만 기억하세요

증상이 없는 날에도 기도 안의 염증은 남아 있습니다



## 1

### 흡입 스테로이드가 치료의 중심입니다

염증을 가라앉히는 **흡입 스테로이드**가 든 약이 기본입니다. 숨 막힐 때만 쓰는 완화제(벤톨린 등) 하나로 버티는 치료는 권하지 않습니다.

완화제만 쓰면 염증은 그대로 남아 점점 나빠질 수 있습니다.

**완화제만 쓰지 않기**



## 2

### 좋아져도 스스로 끊지 않습니다

증상이 없다는 것은 약이 염증을 잘 누르고 있다는 뜻입니다. 끊으면 염증이 다시 올라와 **발작 위험**이 커집니다.

2~3개월 이상 안정되면 진료실에서 단계를 낮출 수 있습니다.

**줄일 때도 의사와 상의**



## 3

### 위험 신호를 알아 둡니다

말을 한 문장도 못 할 만큼 숨이 차거나 입술이 파래지면 **바로 119**입니다. 11장에 신호를 정리했습니다.

완화제를 써도 좋아지지 않으면 기다리지 않습니다.

**위급하면 119**

Tip · 경증 천식에서 필요할 때 부데소니드·포모테를 복합 흡입기를 쓰면, 완화제만 쓸 때보다 심한 발작이 약 64% 줄었습니다(SYGMA 1).

근거 · GINA 2024 · SYGMA 1

## 천식은 기도에 오래 가는 염증입니다

염증 때문에 예민해진 기도가 작은 자극에도 좁아집니다

### 기도에 '불'이 남아 있는 병


기도 점막의 면역세포가 염증을 오래 일으킵니다. 증상이 없는 날에도 염증은 이어집니다.

### 작은 자극에도 좁아지는 기도

찬 공기·꽃가루·동물 털·운동·감기 같은 자극에 기관지가 조이고 붓고 가래가 늘어  
쌉쌉거림·기침·숨참이 생깁니다.

### 오래 두면 기도가 굳습니다

염증을 방치하면 기도가 되돌리기 어렵게 변할 수 있어, 일찍부터 염증을 다스리는  
치료가 중요합니다.



증상이 없어도 염증은 계속됩니다 — 그래서 매일 쓰는 약이 필요합니다

Tip · 무엇이 증상을 일으키는지(동물·꽃가루·찬 공기 등) 적어 두면 진료에 도움이 됩니다.

근거 · GINA 2024

## 천식은 검사로 확인합니다

증상만으로는 진단하지 않습니다 — 좁아졌다가 다시 풀리는 기도를 검사로 봅니다

### 폐활량 검사

숨을 세게 내쉬어 기도가 좁아졌는지 봅니다. 결과가 정상이어도 천식을 완전히 배제하지는 못해 증상과 함께 판단합니다.

### 기관지 확장제 반응 검사

기관지를 넓히는 약을 흡입하기 전과 뒤를 비교합니다. 성인은 1초 동안 내쉬는 양이 **12% 이상**이면서 **200mL 이상** 늘면 천식을 뒷받침합니다.

### 호기 산화질소(FeNO) 검사

내쉬는 숨 속 산화질소를 잽니다. 높게 나오면 제2형 기도 염증 가능성을 시사하며, 다른 검사·증상과 함께 판단합니다.

### 최고호기유량(PEF) 기록

집에서 아침·저녁으로 숨을 세게 불어 기록합니다. 성인은 하루 중 변동이 **10%보다 크면** 천식을 시사합니다.

Tip · 검사 전 흡입약을 쉬어야 할 수 있습니다. 검사 날짜가 잡히면 미리 안내를 받으세요.

근거 · GINA 2024 진단 기준

## 천식 조절 점수(ACT)로 지금 상태를 봅니다

12세 이상용 — 최근 4주를 5개 질문으로 돌아봅니다(5~25점, 높을수록 잘 조절됨)

| 점수     | 상태        | 이렇게 합니다                                                   |
|--------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 20점 이상 | 잘 조절됨     | 지금 치료를 그대로 이어 갑니다. 2~3개월 넘게 안정되면 약 단계를 낮출지 상의합니다.         |
| 16~19점 | 부분적으로 조절됨 | 약을 늘리기 전에 흡입기 사용법·빠뜨린 날·악화 요인을 먼저 점검합니다.                  |
| 15점 이하 | 조절 안 됨    | 치료 조정이 필요합니다. 진단이 맞는지, 비염·역류·수면무호흡 같은 동반 질환이 있는지도 함께 봅니다. |
| 5가지 질문 | 최근 4주     | 일상생활 방해 · 숨 가쁨 · 밤에 깬 횟수 · 완화제 사용 횟수 · 스스로 느끼는 조절 정도      |

Tip · 진료 때마다 점수를 기록하면 좋아지는지 나빠지는지 한눈에 보입니다.

근거 · Asthma Control Test · GINA 2024

## 치료는 단계별로 올리고 내립니다

성인·12세 이상 청소년 기준입니다 — 6~11세 어린이는 따로 정한 치료 계획과 처방을 따릅니다

### 1~2단계 · 증상이 드물 때

매일 쓰는 약 없이, 증상이 있을 때만 흡입 스테로이드·포모테롤 복합 흡입기(심비코트 등)를 씁니다.

### 3단계 · 매일 조금 + 필요할 때


매일 적은 양을 쓰고, 증상이 있으면 같은 흡입기를 더 씁니다.

### 4단계 · 매일 쓰는 양을 늘림

매일 쓰는 양을 늘리고, 증상이 있으면 같은 흡입기를 더 씁니다.

### 5단계 · 전문의 평가

흡입약을 더하거나 주사 치료(생물학적 제제)를 검토합니다.



몇 번, 어떤 세기의 흡입기를 쓸지는 처방전에 적힌 대로 따릅니다

Tip · 3단계부터 매일 쓰는 약과 증상 때 쓰는 약을 한 흡입기로 함께 하는 방법을 'MART'라고 합니다.

근거 · GINA 2024-2025 Track 1

## 한 흡입기로 매일 + 필요할 때

성인·12세 이상 청소년 기준 — 어린이는 따로 정한 계획을 따릅니다 · 약을 올리기 전 확인할 다섯 가지

### 한 흡입기 요법(MART)

MART로 처방받은 경우, 매일 정해진 만큼 쓰고 증상이 있을 때 **같은 흡입기**를 한 번씩 더 씁니다.

- 증상이 나빠지면 흡입 스테로이드도 함께 늘어납니다
- MART로 처방받았다면 완화제를 따로 들고 다니지 않아도 됩니다
- 하루 최대 횟수는 나이·제품마다 다릅니다 — **처방전의 한도**를 따릅니다
- 그만큼 자주 필요하면 바로 진료를 받습니다

### 약을 올리기 전 확인 5가지

점수가 나빠도 약부터 올리지 않습니다. 먼저 이것을 봅니다.

- ① 흡입기를 바르게 쓰는지 — 진료실에서 직접 해 보기
- ② 매일 빠뜨리지 않고 쓰는지
- ③ 담배·알레르기 물질·체중 같은 바꿀 수 있는 요인
- ④ 비염·역류·수면무호흡 같은 동반 질환
- ⑤ 처음 진단이 맞는지 다시 확인

Tip · 진료 때 흡입기를 가져와 쓰는 모습을 보여 주시면 바로 고쳐 드릴 수 있습니다.

근거 · GINA 2024-2025

## 자주 쓰는 복합 흡입기 네 가지

기구 모양과 쓰는 방법이 서로 다릅니다 — 네 흡입기 이름을 알아 두세요



어떤 흡입기든 '바르게 쓰는 법'이 약 선택만큼 중요합니다

Tip · 흡입기가 바뀌면 쓰는 방법도 바뀝니다. 새 흡입기를 받을 때 사용법을 다시 확인하세요.

### 심비코트

부데소니드 + 포모테롤 · 터부헬러(가루형). 세기·처방에 따라 매일 약으로만, 또는 매일·증상 때 함께(MART) 씹니다 — 증상 때 쓸 흡입기는 처방전 확인.

### 세레타이드

플루티카손 + 살메테롤 · 디스크스(가루형). 하루 2번 정해진 대로, 증상 때 추가로 쓰지 않습니다.

### 렐바

플루티카손 푸로에이트 + 빌란테롤 · 엘립타(가루형). 하루 1번 씹니다.

### 포스터

베클로메타손 + 포모테롤 · 분무형(pMDI)·넥스트헤일러. 입자가 아주 작은 약입니다.

## 분무형은 천천히, 가루형은 빠르게

기구에 따라 들이마시는 속도가 정반대입니다

### 분무형(MDI) — 천천히

가능하면 **스페이서**를 끼워 씁니다. 약이 폐까지 더 많이 갑니다.

- 통을 5~10초 흔들고 입술로 꼭 씹니다
- 한 번 누르면서 5초에 걸쳐 천천히 깊게 들이마십니다
- 들이마신 뒤 10초간 숨을 참습니다
- 스페이서에서 휘파람 소리가 나면 너무 빠른 것입니다

VS

### 가루형(DPI) — 빠르게

기구마다 정해진 방법으로 **약을 충전**한 뒤 씁니다.

- 흡입기에서 고개를 돌려 숨을 먼저 끝까지 내쉽니다
- 빠르고 세게 한 번에 들이마십니다
- 흡입기 안으로 숨을 내쉬지 않습니다(습기로 약이 뭉침)
- 욕실처럼 습한 곳에 두지 않습니다

Tip · 스테로이드가 든 흡입기를 쓴 뒤에는 입을 행구고 뱉습니다 — 입안 곰팡이(칸디다) 예방.

근거 · GINA 흡입기 사용법

## “흡입 스테로이드, 오래 써도 괜찮나요?”

먹는 스테로이드와 다릅니다 — 약이 폐로 바로 가서 몸 전체로는 조금만 퍼집니다

### 🛡️ 보통 용량에서는 전신 부작용이 드뭅니다


뼈가 약해지거나 피부가 얇아지는 일은 고용량을 오래 쓸 때 생길 수 있어, 필요한 만큼만 쓰도록 조절합니다.

### 🧑 어린이 키

성장 속도가 조금 늦어질 수 있지만 최종 키 차이는 작습니다. 조절되지 않는 천식이 성장에 더 나쁩니다.

### 🤰 임신 중에도 계속

임신 중에도 끊지 않습니다. 조절되지 않는 천식이 약보다 엄마와 아기에게 훨씬 위험합니다.



꾸준히 쓸수록 천식으로 인한 사망 위험이 줄었습니다

Tip · 운동할 때 숨이 차면, 운동 전에 쓸 흡입약과 방법은 진료실에서 정한 천식 행동 계획을 따르세요.

근거 · GINA 2024 · 흡입 스테로이드 안전성 자료

## 이럴 때는 바로 119 또는 응급실

말을 못 할 만큼 숨차거나 입술이 파래지면 완화제 반응을 기다리지 말고 즉시 119

### 한 문장도 끝까지 말하지 못함

단어만으로 말하거나 걷기 어려울 만큼 숨이 차면 심한 발작 신호입니다.



### 완화제를 써도 그대로

여러 번 흡입해도 좋아지지 않거나, 최고호기유량이 평소의 절반 아래로 떨어졌을 때입니다.



### 입술이 파래지거나 졸리고 멍함

산소가 부족하다는 신호입니다. 즉시 119에 연락합니다.



### 쌽쌽 소리가 갑자기 사라짐

숨소리가 약해지면서 쌽쌽거림이 없어지면 좋아진 것이 아니라 공기가 거의 드나들지 못하는 위험한 상태입니다.

Tip · 응급 상황에서 쓸 약과 연락처를 적은 '천식 행동 계획'을 진료실에서 함께 만드세요.

근거 · GINA 2024 중증 악화

## 오늘부터 지킬 여덟 가지

유발 요인 피하기 · 바른 흡입 · 정기 진료가 조절을 만듭니다

### 매일 쓰는 약

증상이 없어도 처방대로 매일 씹습니다.

### 완화제만 쓰지 않기

흡입 스테로이드가 든 치료가 기본입니다.

### 바른 흡입

분무형은 천천히, 가루형은 빠르고 세게.

### 입 헹구기

스테로이드 흡입 뒤 헹구고 뱉습니다.

### 행동 계획

초록·노랑·빨강 구역별 대처를 알아 둡니다.

### 유발 요인 피하기

금연 · 미세먼지 날 KF94 · 진드기 방지 커버.

### 예방접종

해마다 독감 백신 · 폐렴구균 백신도 상의.

### 위험 신호

말 못 함 · 파란 입술 · 숨소리 약해짐  
→ 119.

Tip · 천식은 완치는 어렵지만 꾸준한 치료로 증상 없이 지내는 상태를 오래 유지할 수 있습니다.

근거 · GINA 2024

## 다시 보기 · 문의

QR을 스캔하면 같은 자료를 휴대폰에서 다시 열 수 있습니다

### **광고바른내과**

경기 용인 수지구 광고중앙로 298, 4층 · **031-893-4560**

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

### **이 자료의 성격**

천식으로 치료받는 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 약의 종류·용량·단계 조정은 담당 의료진과 상의해 정합니다.

### **참고한 자료**

GINA 2024-2025 · SYGMA 1 임상시험 · Asthma Control Test(ACT) · 식약처 허가 복합 흡입제 정보 ·  
흡입 스테로이드 안전성·임신 중 부데소니드 자료



SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 휴대폰에서  
같은 자료를 다시 볼 수 있어요