

## 복부초음파에서 자주 나오는 소견

검진이나 진료 중 복부초음파에서 간·콩팥의 물혹, 담석, 담낭용종이 종종 발견됩니다. 대부분 크게 걱정할 소견은 아니지만, 언제는 지켜보고 언제는 추가로 확인하는지 정리했습니다.

### 간 물혹과 콩팥 물혹

**간 물혹** — 단순 물혹은 임상적으로 의미가 크지 않습니다

간의 단순 물혹은 흔히 발견되며, **임상적으로 의미가 크지 않아** 증상이 없으면 치료 없이 지켜봅니다.

벽이 두껍거나 모양이 애매하면 추가 영상검사를 상담합니다.

**콩팥 물혹** — 단순 물혹은 위험도가 높지 않습니다

단순 물혹은 위험도가 높지 않습니다. 다만 **격벽(물혹 안의 칸막이)·벽 두께·조영증강** 부분을 보고 **보즈니아(Bosniak) 분류**로 위험도를 나누는 것이 중요합니다.

격벽이 보이거나 복잡하면 CT·MRI로 분류를 확인합니다.

### 담석 — 증상 없으면 관찰합니다

**증상이 없을 때**

증상이 없는 **담낭 담석**은 대부분 바로 수술하지 않고 관찰합니다.

담석이 **3cm를 넘으면** 증상이 없어도 수술의 이득과 위험을 상담할 수 있습니다.

**통증이 생기면**

기름진 식사 뒤 **오른쪽 갈비뼈 아래나 명치가 쥐어짜듯 아프면** 외과 진료를 상담하세요.

통증이 계속되거나 **열이 함께** 나면 예정된 진료를 기다리지 말고 빨리 오세요.

### 담낭용종과 초음파의 한계

**담낭용종**

**1cm 이상이면** 수술을 상담하고, 작으면 **1년마다** 크기를 봅니다.

추적 중 저절로 없어지기도 합니다. 크기별 세부 기준은 **‘담낭 폴립 추적 안내’** 유인물에서 자세히 안내합니다.

**초음파의 한계**

복부초음파는 장 속 공기에 가려 **췌장은 일부만** 보일 수 있습니다.

검사 전 **금식**하면 담낭이 잘 퍼져 더 정확하게 보입니다.

**흔한 오해**

**“담석이 있으면 무조건 수술해야 한다”** → 증상이 없으면 대부분 관찰합니다.

**“초음파로 복통 원인을 다 알 수 있다”** → 장 속 공기에 가려 일부만 보일 수 있어, 필요하면 다른 검사를 함께 봅니다.

**빨리 진료가 필요한 경우**

오른쪽 윗배 통증이 계속될 때 — **열이나 황달**이 함께 생기면 응급실로

콩팥 물혹이 있는 분에서 **혈뇨, 발열, 새로 생긴 옆구리 통증**이 있을 때

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한간담체외과학회 단순 간낭종 진료지침 2025 · 캐나다비뇨의학회 남성 신장 병변 지침 2023 · NICE 담석질환 지침(CG188) 2014 · 일본 담석질환 진료지침 2021 · 대한복부영상의학회 담낭용종 권고 2025(KJR)

본 자료는 일반 안내입니다. 실제 크기·모양·추적 간격은 검사 소견과 위험요인에 따라 담당 의료진과 상담해 정합니다.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → [edu.gwanggyobarun.com/handouts/imaging/abdominal-us-common-findings/](http://edu.gwanggyobarun.com/handouts/imaging/abdominal-us-common-findings/)

