

기능성 소화불량 — 내시경은 괜찮은데 왜 더부룩할까

위가 움직이고 느끼는 방식의 문제일 수 있습니다 · 위장약 반응을 보며 다음 단계를 정합니다

왜 내시경이 정상인데 더부룩할까요?

내시경에서 큰 이상이 보이지 않아도 식후 더부룩함, 조금만 먹어도 배부른 느낌, 명치 통증·쓰림은 실제로 생길 수 있습니다. 위가 음식을 받아들이고 내보내는 방식, 위의 감각, 뇌와 장의 상호작용 문제일 때가 많아 **병보다 기능 문제일 확률이 높습니다**. 흔히 있는 문제이며, '정상' 검사 결과가 증상이 없다는 뜻은 아닙니다. 식후 팍 찬 느낌·조금만 먹어도 배부른 느낌과 명치 통증·쓰림은 치료 방향을 정할 때 구분해 볼 증상이니 진료 때 자세히 말씀해 주세요. 위와 뇌 신호가 예민해진 상태입니다.

위장약을 먼저 먹어 보며 다음 단계를 정합니다

먼저 해보는 것

약을 써 보며 증상 변화를 확인합니다. 안 들으면 그때 초음파·CT를 합니다. 다만 며칠 약을 먹고 좋아졌다는 이유만으로 다른 병이 없다고 확정할 수는 없으니, 먹다 말다 하지 말고 처방대로 끝까지 복용한 뒤 진료 때 경과를 알려 주세요. 필요하면 헬리코박터균 검사도 함께 고려합니다. 안 좋아지면 다른 약이나 검사를 다시 상의합니다. 위험 신호가 있으면 먼저 알려주세요.

지금 식사 · 생활습관

식사는 이렇게

- 잡곡·생야채·샐러드·과일·밀가루는 몸에 좋아도 지금은 소화가 안 됩니다.
- 죽·누룽지·쌀밥·감자·두부로 위를 쉬게 하세요.
- 어떤 음식이 불편한지는 사람마다 다르니, 드신 음식과 증상을 같이 기록해 두면 도움이 됩니다.
- 증상이 가라앉으면 식사 범위를 다시 넓혀 갑니다.

습관은 이렇게

- 1 식후엔 가볍게 걷기 — **담즙 역류에도 도움**
- 2 처방약은 먹다 말다 하지 말고 **끝까지 복용**합니다.
- 3 평소 마시던 **커피는 갑자기 끊지** 않습니다.
- 4 **편두통**이 위장 증상으로 먼저 오기도 합니다.

자주 나오는 오해

- **"양배추·채소는 위에 좋으니 많이 먹을수록 좋다"** → 건강식이라도 지금은 증상을 키울 수 있습니다.
- **"초음파로 체장을 다 볼 수 있다"** → 초음파 한 번으로 체장 문제를 모두 배제할 수 없습니다. 필요하면 CT를 봅니다.
- **"더부룩하면 내시경·초음파를 바로 다 해봐야 안심"** → 필요한 검사는 나이·위험 신호·증상 양상에 따라 다릅니다.

RED FLAGS · 미루지 말고 진료

삼키기 점점 어려워짐 · 반복되거나 계속되는 구토 · 원인 모를 체중 감소가 있으면 며칠 더 지켜보지 말고 진료받으세요. **피를 토하거나 검은 변을 보면 응급실로 가세요.** 위암 가족력, 최근 진통소염제·항혈전제 사용도 꼭 알려주세요. 국내 지침은 일정 연령 이상에서 새로 생긴 소화불량에는 내시경을 먼저 권합니다. 치료해도 계속 나빠지면 다시 진료받으세요. 덩어리가 만져지거나 황달이 있어도 마찬가지입니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한소화기기능성질환·운동학회 기능성 소화불량 진료지침 (2020) · Rome IV 진단기준 (2016) · British Society of Gastroenterology guidelines on the management of functional dyspepsia (Gut, 2022)

본 자료는 일반 환자교육용입니다. 증상이 지속되거나 위 위험 신호가 있으면 지체 말고 진료받으세요.



집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/gi/functional-dyspepsia/