


국제 전립선 증상 점수표 (IPSS)

International Prostate Symptom Score — 최근 한 달 동안 소변을 보신 상태를 떠올리며, 문항마다 한 칸에만 ✓ 표시해 주세요.



전립선은 방광 바로 아래에서 소변길(요도)을 감싸고 있어, 커지면 소변길이 좁아져 소변보기가 불편해질 수 있습니다.

이 설문은 그런 소변 증상 7가지와 불편한 정도를 점수로 적는 국제 표준 설문입니다. 치료 전후를 비교할 때도 씁니다.

소변에 피가 섞이거나 소변볼 때 아프면 점수와 상관없이 당일 진료를 받으세요. 소변이 마려운데 갑자기 나오지 않으면 즉시 응급실로 가세요.

성명 (Name) _____ 생년월일 (DOB) _____ 작성일 (Date) _____

1~7번 증상 (Symptom score) 최근 한 달 동안 · 칸 안 숫자 = 점수	전혀 없다	드물게 있다 (5번 중 1번)	가끔 있다 (5번 중 1, 2번)	절반 정도 (5번 중 2, 3번)	절반 이상 (5번 중 3, 4번)	항상 (거의 매번)
1. 배뇨 후 시원치 않고, 소변이 남아있는 느낌을 받는 경우가 있습니까?	0	1	2	3	4	5
2. 배뇨 후 2시간이 채 지나기 전에 또 소변을 보는 경우가 있습니까?	0	1	2	3	4	5
3. 배뇨 중 오줌줄기가 끊어졌다가 다시 힘을 주면 나오는 경우가 있습니까?	0	1	2	3	4	5
4. 소변이 마려울 때 참기가 힘든 경우가 얼마나 자주 있습니까?	0	1	2	3	4	5
5. 배뇨시 소변줄기가 약하다고 느낀 경우가 얼마나 자주 있습니까?	0	1	2	3	4	5
6. 소변이 마려운데 나오지 않고 한참 기다려야 나오는 경우가 있습니까?	0	1	2	3	4	5
7번은 횟수로 답합니다	0번	1번	2번	3번	4번	5번 이상
7. 밤에 주무시는 동안 몇 번이나 깨어서 소변을 보십니까?	0	1	2	3	4	5

8번 삶의 질 (Quality of life) 0~6점	매우 만족	만족	대체로 만족	그저 그렇다	대체로 불편	아주 불편	이 상태로는 못살겠다
8. 만일 지금 같은 배뇨상태가 계속 지속된다면 어떻게 생각되십니까?	0	1	2	3	4	5	6

직원용 · 채점 안내

증상 점수 (1~7번 합) _____ / 35점

삶의 질 (8번) _____ / 6점 · 합계에 넣지 않음

경증 (Mild)

0~7점

중등도 (Moderate)

8~19점

중증 (Severe)

20~35점

점수는 증상의 정도일 뿐, 진단이 아닙니다. 치료 여부와 방법은 진료 때 의사가 판단합니다.

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

출처 — IPSS: Barry MJ 외, J Urol 1992;148:1549 (AUA 증상지수) · 한국어판: 최환락 외, 대한비뇨기과학회지 1996;37:659-665 (번역 타당도·신뢰도 검증) · 문구 대조: Kim JH 외, Korean J Urol 2013;54:249

본 설문지는 증상을 기록하는 도구이며 진단을 대신하지 않습니다. 결과는 진료실에서 담당 의사와 함께 확인해 주세요.

휴대폰으로 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/forms/ipss-prostate-symptom-score/

