

체중 감량, 한 달 2kg이 정답인 이유

GLP-1 계열 약물을 쓰지 않고 식사·생활습관으로 체중을 관리하는 분들을 위한 안내입니다. 빨리 빼는 것보다 천천히, 오래 유지하는 방법을 정리했습니다.

🏃 왜 천천히 빼야 할까요?



균형 잡힌 한 끼: 채소 넉넉히 · 단백질 유지

굶거나 단식하면 생기는 일

굶거나 단식하면 근육부터 함께 빠지고, 몸이 에너지를 아끼는 '저전력 모드'로 바뀌면서 요요가 오기 쉽습니다.

탄수화물을 전부 끊을 필요는 없습니다. 줄여야 하는 것은 흰쌀·빵·단 음료 같은 정제 탄수화물이고, 단백질과 채소는 그대로 유지합니다.

체중이 빠지는 방식

체중은 계단식으로 빠집니다. 며칠 정체돼도 실패가 아니며, 1년 이상 꾸준히 유지해야 몸의 기준점이 서서히 바뀝니다.

목표는 한 달 2kg 안팎(주 0.5~1kg 이내)이 정답입니다 — 빨리 빼기보다 오래 유지하는 속도가 중요합니다.

📊 한눈에 보는 핵심 수치 (한국 성인 기준)

구분	기준 수치	임상적 의미 및 권고
과체중 기준	BMI 23 이상	아시아 성인 기준 과체중 단계
비만 기준	BMI 25 이상	한국 성인 비만 진단 기준
복부비만 기준	허리둘레 남 90cm·여 85cm 이상	한국인 복부비만 진단 기준
첫 감량 목표	6개월간 현재 체중의 5~10% 감량	혈압·혈당·중성지방 등 대사 지표 개선에 도움
권장 감량 속도	한 달 2kg 안팎 (주 0.5~1kg)	평소보다 하루 500~1,000kcal 적게 섭취 시 안전한 감량에 도움
유지 기간	1년 이상	몸의 기준점이 서서히 바뀌는 기간

나의 목표 감량 속도는 건강 상태에 맞춰 진료 때 함께 정합니다.

🍴 실천 원칙 (Do & Don't)

구분	👉 이렇게 하세요 · DO	❗ 이것은 피하세요 · DON'T
식사	1. 흰쌀·빵·단 음료 같은 정제 탄수화물만 줄이기 2. 단백질·채소는 끼니마다 그대로 유지 · 하루 500~1,000kcal 적게 먹으면 주 0.5~1kg 감량에 도움	1. 극단적인 단식·굶기·식사 거르기 2. 고기·단백질 한 가지만 먹고 탄수화물 완전히 끊기
운동·점검	3. 근력 운동을 함께해 근육 지키기 · 중강도 유산소 주 150분+ 및 근력 운동 주 2~3회 권장 4. 인바디·체중은 하루 숫자보다 몇 주 흐름으로 보기 — 수분 상태에 따라 흔들립니다	3. 며칠 정체됐다고 포기하기 — 계단식 정체는 정상입니다 4. 목표 체중에 도달했다고 관리를 바로 끝내기

❗ 흔한 오해

흔한 오해	올바른 사실
"적게 먹을수록 빨리 빠져서 좋다"	빨리 빼면 근육 손실과 절전 반응이 커져 오히려 요요 위험이 높아집니다.
"밥 끊고 고기만 먹으면 된다"	탄수화물을 전부 끊을 필요는 없습니다. 정제 탄수화물만 줄이면 됩니다.

🚨 이럴 땐 응급실·바로 진료 · IMPORTANT

식사를 심하게 제한하는 중 실신·의식 저하·물도 못 마시는 상태가 있으면 계획을 멈추고 응급실로 가세요. 반복 구토·일상생활이 어려운 식약감이 있으면 즉시 진료받으세요. 당뇨약 복용 중이면 식사를 크게 줄이기 전에 의료진과 먼저 상의하세요. (☎ 031-893-4560)

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 대한비만학회 비만 진료지침 2022(8판) · 2024(9판)

본 자료는 일반적 권고이며, 목표 감량 속도는 개인의 건강 상태에 따라 다를 수 있습니다. GLP-1 계열 약물 사용 중이면 담당 의사와 별도로 상담하세요.

집에서 다시 보기

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/lifestyle/weight-loss-2kg-month/

