

1주일 운동 스케줄과 동반질환별 안전 주의사항

유산소 150분 + 저항 2회를 한 주에 어떻게 분배하는지, 운동 전·후 자가 체크와 동반질환(고혈압·당뇨·관상동맥질환)별 주의사항을 정리했습니다.

1주일 운동 스케줄 예시 (총 유산소 150분 + 저항 2회)

요일	운동 종류	시간 / 강도	핵심 포인트
월요일	유산소 — 빠른 걷기	30분 / 중강도	HR 102~119
화요일	저항 — 머신 8종목	40분 / 2~3 set	대근육 위주
수요일	유산소 — 자전거 또는 수영	30분 / 중강도	관절 부담 ↓
목요일	저항 — 머신 8종목 + 코어	40분 / 2~3 set	발살바 금지
금요일	유산소 — 인터벌 걷기	30분 / 중-고	3분 빠르게/2분 천천히
토요일	유산소 — 등산 또는 장거리 걷기	30~60분 / 중강도	즐기면서 길게
일요일	회복 — 가벼운 산책 + 스트레칭	20~30분 / 저강도	근육 회복일

운동 전 자가 체크 · BEFORE

- 혈압 측정** — 안정 시 SBP > 180 또는 DBP > 110이면 운동 보류
- 공복 혈당** — 70 이하면 간식 후 운동, 250 이상이면 케톤·증상 확인 후 보류/상담
- 흉통·호흡곤란** 있으면 그날 운동 중단
- 충분한 수분** — 운동 30분 전 250ml 섭취
- 신발·복장** — 쿠션 좋은 운동화, 무릎·발목 보호
- 워밍업 5분** — 가벼운 걷기·관절 가동 후 본운동

즉시 중단 신호 · STOP

- 가슴 압박감·통증** — 협심증 의심, 즉시 중단·119
- 심한 호흡곤란** — 평소보다 과한 숨참, 휴식 후도 지속
- 어지러움·실신감** — 즉시 앉거나 누워 안정
- 식은땀·오심** — 저혈당 또는 심혈관 신호
- 한쪽 마비·말 어눌** — 뇌졸중 의심, 즉시 119
- 근육 심한 통증·갈색뇨** — 횡문근융해 의심 (스타틴 복용 시)

동반질환별 운동 주의 & 추적 관리

동반질환별 주의 (COMORBIDITY)

고혈압 — 저항 운동 시 발살바 금지, 호흡 유지
당뇨 — 운동 전후 혈당 측정, 인슐린 부위 회피
관상동맥질환 — 의사 클리어 후 HR < 70%로 시작
스타틴 복용 — 근육통·갈색뇨 시 즉시 중단·외래

추적 관리 (FOLLOW-UP)

8~12주차: 지질 검사 1차 — LDL·TG·HDL 변화
3~6개월: 운동량·체중·허리둘레 + 약물 조정
유지: 6~12개월마다 지질·간기능·CK 점검
즉시 외래: 흉통·근육통·실신 시 ☎ 031-893-4560