

# 고혈압 환자를 위한 저염식 가이드

저염식 (Low-Sodium Diet) — 하루 나트륨 2,000mg 이하로 줄이면 수축기 혈압을 평균 5~10mmHg 낮출 수 있습니다. 핵심 수치와 실천법을 한 장으로 정리했습니다.



## 한눈에 보는 핵심 수치

한국인 평균 섭취

**3,200**

mg / 일 (목표의 1.6배)

권장 목표

**2,000**

mg / 일 (대한고혈압학회)

소금 환산

**5**

g / 일 (1작은술)

기대 효과

**-5~10**

mmHg (수축기 혈압)

## 실천 항목 (Do & Don't)

### 이렇게 하세요 · DO

1. 신선한 채소·과일 매끼 ½접시 이상 (Na < 50mg)
2. 직접 조리 시 소금 계량 — 1작은술(5g) 이내
3. 레몬즙·식초·허브·후추로 맛내기 (대체 양념)
4. 칼륨 풍부 식품 — 바나나·감자·시금치·고구마 (Na 배출 ↑)
5. 영양성분표 확인 — 1회분당 Na 400mg 이하 선택
6. 흰살생선·두부·계란으로 단백질 (Na < 100mg)
7. 물 하루 1.5L 이상 — 나트륨 배출 촉진

### 이것은 피하세요 · DON'T

1. 국물 다 먹기 — 라면 국물 1대접 ≈ 1,800mg
2. 젓갈·장아찌 1큰술 ≈ 1,200mg (60% 도달)
3. 가공육 — 햄·소시지 100g ≈ 900mg
4. 외식 소스·드레싱 듬뿍 (간장 1큰술 ≈ 1,000mg)
5. 인스턴트·배달 — 짜장면 1그릇 ≈ 2,400mg
6. 통조림·즉석국 자주 사용 (Na 1,000mg+)
7. 단무지·피클 등 절임류 무제한 섭취

### 복약 중인 분 · IMPORTANT

이뇨제(다이크로진·라식스 등) 또는 ARB·ACE 억제제 복용 중에 갑작스럽게 나트륨 섭취를 크게 줄이면 기립성 저혈압·어지러움·전해질 불균형이 생길 수 있습니다. 1~2주에 걸쳐 점진적으로 줄이고, 어지러움이 지속되면 바로 외래로 연락 주세요.  
(☎ 031-893-4560)



## 자주 먹는 식품의 나트륨 함량과 실천 플랜

한국인이 자주 섭취하는 음식의 1회분당 Na 함량과 라벨 읽는 법, 1주일 점진 감량 가이드입니다.

### 한국인 자주 먹는 식품의 Na 함량 (1회분 기준)

| 식품         | NA (MG) | 1회분량       | 일일 권장 대비 |
|------------|---------|------------|----------|
| 라면 (국물 포함) | 1,800   | 1봉 (120g)  | 90%      |
| 짜장면 · 짬뽕   | 2,400   | 1그릇        | 120%     |
| 된장찌개       | 2,000   | 1뚝배기       | 100%     |
| 김치         | 300     | 50g (5쪽)   | 15%      |
| 햄 · 소시지    | 900     | 100g       | 45%      |
| 젓갈 · 장아찌   | 1,200   | 1큰술 (15g)  | 60%      |
| 간장         | 1,000   | 1큰술 (15ml) | 50%      |

#### 가공식품 라벨 읽기 · 7가지 체크

- "1회 제공량" 먼저 확인 (전체 용량과 다름)
- 1회분당 나트륨 mg 확인
- "%영양성분 기준치" — 20% 이상은 높음
- 저나트륨 표시 = 1회분 120mg 이하
- "나트륨 무첨가" ≠ 0mg (자연함량 있음)
- 같은 종류는 Na 낮은 제품 비교 선택
- 총량 × 회분 곱해 실제 섭취량 계산

#### 1주일 점진 감량 플랜

**Day 1-2:** 국물 양 1/2로 줄이기 시작  
**Day 3-4:** 라면·인스턴트 1회 → 0회  
**Day 5:** 외식 1끼를 집밥으로 전환  
**Day 6:** 식초·레몬·허브 양념 시도  
**Day 7:** 가공식품 라벨 직접 확인  
**2주차~:** 국물 1/3만 마시기 정착  
**4주차:** 가정 혈압 측정 → 외래 점검

### 저염 하루 식단 예시 (총 ~1,800mg)

**아침 · ~400MG** 현미밥 1공기 · 두부조림(소금 계량) · 시금치나물 · 사과 ½개 · 보리차 — 두부 데치면 Na < 50mg  
**점심 · ~700MG** 잡곡밥 · 닭가슴살 샐러드(레몬 드레싱) · 미역국 1/3공기 · 구운 고구마 — 외식 시 "싱겁게, 국물 따로"  
**저녁 · ~700MG** 현미밥 · 흰살생선구이(허브) · 김치 50g · 나물 무침 · 바나나 1개 — 김치 50g ≈ Na 300mg