

당뇨 목표 숫자와 저혈당 대처

목표는 사람마다 다릅니다. 가끔 튀는 값보다 **평균**을 보고, 저혈당이 의심되면 **느낌만으로 사탕을 먹지 말고 먼저 재 보세요** (젤 수 없으면 당부터). 혈당이 높아도 증상이 없을 수 있으니, 증상이 없어도 검사는 꼭 받으셔야 합니다.

목표 숫자는 사람마다 다릅니다 (My Targets)

일반적인 목표 · GENERAL TARGETS

구분	목표
젊으면	당화혈색소 6.5
대부분	당화혈색소 7 미만
고령	당화혈색소 7~7.5 도 괜찮습니다
약 먹는 중	자가혈당 공복 80~110 · 식후 2시간 180 미만

나의 목표 · FOR YOU

나이·건강 상태·저혈당 위험을 보고 **진료실에서 정해 말씀드립니다**. 당화혈색소·공복 혈당·식후 2시간 혈당 목표를 함께 확인하세요.

고령에서는 너무 낮추다 생기는 **저혈당**이 더 위험합니다. 숫자를 무조건 낮추는 게 목표가 아닙니다.

저혈당은 70 미만 — 먼저 재 보세요 (Hypoglycemia)



이렇게 대처하세요 · WHAT TO DO

증상 **식은땀** **떨림** **두근거림** **어지럼**

- 1 먼저 재 보세요. 느낌만으로 사탕을 먹지 않고, 숫자부터 봅니다. **젤 수 없으면** 정신이 또렷하고 잘 삼킬 수 있을 때 당부터 드세요.
- 2 70 미만이면 당 **15~20g** — 사탕·주스·포도당 등으로 바로 드세요.
- 3 15분 뒤 다시 재기 — 여전히 70 미만이면 한 번 더 드세요.
- 4 기록해서 알려 주세요 — 저혈당이 반복되면 약 조정을 상의해야 합니다.

흔한 오해 vs 바로 알기 (Common Myths)

자주 듣는 오해 · MYTH	바로 알기 · FACT
"가끔 200이 나오면 약을 바꿔야 한다"	가끔 튀는 값은 무시하고 평균 을 봅니다. 약은 평균과 당화혈색소로 정합니다.
"5.5까지 낮춰야 한다"	너무 낮추면 저혈당 이 생깁니다. 목표는 사람마다 다릅니다.
"증상이 없으면 괜찮다"	혈당이 높아도 증상이 없을 수 있습니다 . 그사이 눈과 콩팥이 망가질 수 있고, 진행하면 되돌리기 어렵습니다. 그래서 일찍 찾아야 합니다.
"메트포르민 먹고 속이 불편하면 약이 안 맞는 것"	초기 불편은 줄어들 수 있지만 , 심하거나 지속되면 진료실에 알려 주세요.

증상이 없어도 정기 검사 · CHECK-UP

소변(미세알부민)·피검사 — 콩팥 확인, 1년에 한 번 이상
눈 검사(안저) — 망막 확인, 1년에 한 번 이상
당화혈색소 — 3~6개월마다(진료실에서 정합니다)

즉시 119 또는 응급실 · EMERGENCY

의식이 흐리거나 삼키기 어려우면 먹이지 말고 119
당을 먹고 15분 뒤에도 70 미만이 반복될 때
혈당이 계속 매우 높으면서 구토·심한 갈증·처짐

광교바른내과 · Gwanggyo Barun Internal Medicine

경기 용인 수지구 광교중앙로 298, 4층 · ☎ 031-893-4560

평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30 · 일요일·공휴일 휴진

근거 — 2025 대한당뇨병학회 진료지침 (KDA) · ADA Standards of Care in Diabetes 2026 · ACCORD (NEJM 2008)

본 자료는 일반 안내입니다. 개인의 목표 숫자와 약 조정은 나이, 건강 상태, 저혈당 위험에 따라 진료실에서 정합니다.

QR 대신 입력 → edu.gwanggyobarun.com/handouts/endo/diabetes-targets-hypoglycemia/

집에서 다시 보기

